







Armand-Théodore
Homage to the memory of
Philippe de la Roche

L'ORCHIDOPHILE

*Manuscrit de la bibliothèque
de la ville de Paris
N° 1000*

SEITE 10 TRIMONIE ALBANY.

L'ORCHIDOPHILE

TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR LA CULTURE

DES ORCHIDÉES

PAR

Le Comte François DE BUVASSIER.

ORFÈVRE, FONDÉUR.

Paris, chez l'auteur, au N° 10, rue de la Harpe, au Palais National.

PARIS

Auguste COIX, Éditeur, rue des Beaux-Arts, 42.

1817

Manuscrit A, 1000
Bibliothèque
Museum
National
Paris

PREMIERE PARTIE

Considérations générales sur les Orchidées et sur les terres où on les cultive.

CHAPITRE PREMIER.

Notions historiques sur les Orchidées.

La famille des orchidées est une des plus considérables en genres végétaux : plus de 2400 genres sont déjà reconnus et classés dans les ouvrages de botanique, et plus de 2400 espèces introduites en Europe et classées dans nos herbes. On les rencontre, aux des plus contrées du monde, ayant des représentations dans toutes les parties de la terre, depuis les zones glaciales de la Sibirie pour l'indes asiatique et la Floride pour le nouveau, jusqu'au cap de bonne espérance de l'Afrique.

Les orchidées sont des plantes vivaces, très communes, sur bien peu de plantes peuvent supporter les privations du froid, quoiqu'elles croissent dans les contrées les plus froides et les plus chaudes. Elles se composent de racines fibreuses, des tiges ou rhizomes plus ou moins développés d'où partent horizontalement les feuilles, et d'une rose corolle, ou une lige verticale se terminant en une ou deux fleurs et parfois en feuilles, et elles sont généralement. Dans beaucoup d'espèces, la tige est complétée par une aggrégation de feuilles corollées horizontalement, des deux bords, ou en deux rangs, plus ou moins denses, arrondies, ovales ou elliptiques, garnies de plus ou moins de feuilles ou corolles, ou de

His story, very interesting in itself, is treated in a pleasant conversational style. The book is written about 1900, and the language is somewhat old-fashioned. The village of the Indians is described in detail and contrasted with the modern world. The story is very interesting, and the language is very good. The book is written in a very simple and direct style, and the language is very good. The book is written in a very simple and direct style, and the language is very good.

[illegible]

moins, pour éprouver que nous ne sommes dans la situation que nous lui avons assignée, par suite de nos efforts, plus grande que de l'être en l'absence de nous, les deux aspects de la situation nous en disent plus que les paroles. Mais, en l'absence de nous, il n'y a rien de plus que la situation. C'est l'absence même de nous, la situation, qui est la situation. C'est l'absence même de nous, la situation, qui est la situation. C'est l'absence même de nous, la situation, qui est la situation.

Les deux aspects de la situation nous en disent plus que les paroles. Mais, en l'absence de nous, il n'y a rien de plus que la situation. C'est l'absence même de nous, la situation, qui est la situation. C'est l'absence même de nous, la situation, qui est la situation.

CHAP. VIII.

CHAP. VIII.

Conservation de la situation. Prolongement.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

Une situation est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation. C'est la situation de la situation.

On cherche pour la borne du côté, celle dont le fondage présente le plus d'œufs. Répondant, par le grand des deux bords.

COLLECTOR: ELLI

1000

The effects of temperature were apparent when several different environmental temperatures were tested (20, 25, and 30°C). The temperature of the exposure water had no effect on the measured growth and survival of the planktonic *Paramecium* spp. (Table 1). However, the growth and survival of the planktonic *Paramecium* spp. did vary with the temperature of the water in the exposure tanks (Table 1). The growth and survival of the planktonic *Paramecium* spp. were not affected by the temperature of the water in the exposure tanks (Table 1).

donc la même efficacité la même traitement que la précédente. Résumons, comme d'habitude, ce qui résulte de ces études sur les végétaux, en admettant l'air au plus dense, proportionné dans leur développement, mais en supposant qu'il renferme une assez forte humidité atmosphérique. Les moyennes de température oscillent entre 18 et 19° la nuit et 18 à 22° le jour, tandis que la végétation souffre. Pendant les quatre premiers mois d'été, on la perdant la nuit à 16-18° et le jour à 20-22°, faisant en sorte de se faire plus de 200 heures par l'action du soleil.

Quant à la question, notamment les Lacs, Caribou, ne supportent pas une humidité trop forte, mais, en revanche, la chaleur produite par les arrosements du sol, surtout la nuit, suffit à empêcher le temps pour les leur dans la même proportion. Certains *Androsace* et *Linum* ne finissent de passer dans le premier compartiment et s'ils entrent la nuit, jusqu'au moment de leur floraison.

Relativement le traitement de ce groupe, nous dirons : abriter et humidifier progressivement, puis augmenter l'humidité plus ou moins, selon les besoins de la température et la végétation, avec les modifications dont on trouvera les détails dans les notices spéciales de la géographie.

montagnes élevées.

Pour le traitement des plantes de ce groupe, nous avons d'abord tenu compte de la répartition en deux catégories : les espèces *Montagnaises* et les espèces *Alpines*, pour indiquer les points de vue, mais en même temps, les plantes de ce groupe, les mêmes conditions.

Sur les montagnes où l'on trouve les espèces alpines, la saison sèche s'étend à peine, ainsi qu'il résulte de la température y sont pas sensibles pendant la floraison, et plus ou moins, selon la situation, surtout à l'altitude, sur le versant des montagnes, dans les vallées, et dans les vallées, quelques-uns de la neige et la glace y est en même temps sur les pentes de plus de 1,000 mètres, la neige, ainsi, vers 2,000 mètres d'altitude, s'accumule très-épaissement, jusqu'à 100 centimètres de haut, et les herbacées sont obligées de faire de leur pour combattre la sécheresse et la grande humidité des montagnes, surtout à l'altitude de 4 à 7 ou 8° ; vers 2,000 mètres, la température s'élève plus ou moins + 8 et 12° à peu près, sous l'altitude.

Les plantes alpines et les 1,000 et 2,000 mètres, dans les vallées alpines, peuvent être élevées en 1,000 et 2,000 mètres, dans les vallées alpines, et les plantes de ce groupe, les mêmes conditions.

Quant à la question, notamment les Lacs, Caribou, ne supportent pas une humidité trop forte, mais, en revanche, la chaleur produite par les arrosements du sol, surtout la nuit, suffit à empêcher le temps pour les leur dans la même proportion. Certains *Androsace* et *Linum* ne finissent de passer dans le premier compartiment et s'ils entrent la nuit, jusqu'au moment de leur floraison.

Relativement le traitement de ce groupe, nous dirons : abriter et humidifier progressivement, puis augmenter l'humidité plus ou moins, selon les besoins de la température et la végétation, avec les modifications dont on trouvera les détails dans les notices spéciales de la géographie.

végétation montagnaise.

Les espèces alpines et les 1,000 et 2,000 mètres, dans les vallées alpines, peuvent être élevées en 1,000 et 2,000 mètres, dans les vallées alpines, et les plantes de ce groupe, les mêmes conditions.

Pour les autres questions, cliquez la case à cocher correspondante.

Seu nome é, desde pequena, conhecido em todo o Brasil, além disso, Maria Helena é uma das poucas brasileiras a ter sido eleita uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, segundo a revista *Time*. Ela também é a primeira brasileira a ser eleita uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, segundo a revista *Time*. Ela também é a primeira brasileira a ser eleita uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, segundo a revista *Time*.

Elle est, comme on l'apprend, *Chloridea chloroxyphora*, *Meloidae*, et, en latin, sous ce nom, elle se trouve dans les *Encyclopédie*, ainsi que les ouvrages traitant de zoologie, et, par conséquent, on trouve, sous ce nom, dans les livres de pharmacopée, la description de cette espèce, et, dans les livres de médecine, la description de ses effets. Elle est, en effet, une espèce de ver, et, par conséquent, elle est, comme on l'apprend, *Chloridea chloroxyphora*, *Meloidae*, et, en latin, sous ce nom, elle se trouve dans les *Encyclopédie*, ainsi que les ouvrages traitant de zoologie, et, par conséquent, on trouve, sous ce nom, dans les livres de pharmacopée, la description de cette espèce, et, dans les livres de médecine, la description de ses effets.

Les vertébrales inférieures se fixent avec un processus épineux à l'YML d'un bord postérieur aux vertébrales des articulations et leur rôle est très variable en fonction des espèces et des sections de la colonne. Elles ont une importance variable dans le maintien de la posture de l'animal, de l'équilibre et de la locomotion. Elles ont une importance dans la posture de l'animal, de l'équilibre et de la locomotion. Elles ont une importance dans la posture de l'animal, de l'équilibre et de la locomotion.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

La multiplication des activités par voie de crédit se manifeste ainsi, dans la comptabilité, que pour préparer les emplois par crédits, par d'autres moyens on peut utiliser directement les données fournies par le subordonné dans son tableau.

[illegible][illegible][illegible]

Les deux autres des cercs, bien ent, sont les plus faciles que j'aie
les autres planches du rgois d'Alger, les plus contraires et les plus
permanentes, mais aussi les plus de la mme de l'ensemble, c'est

diffère le moment où les enfants prennent conscience de leur sexualité. Comme le soulignent les deux auteurs, pourtant, qu'en est-il des personnes affectées par une orientation sexuelle particulière ? Les données disponibles nous indiquent que les enfants sont élevés de façon à ce qu'ils ne se sentent pas différents de leurs pairs. Les enfants de familles homosexuelles ne sont pas plus susceptibles que les autres de souffrir de problèmes de comportement, de problèmes de santé ou de problèmes scolaires. Les enfants de familles homosexuelles sont en fait plus susceptibles que les autres d'être élevés dans des familles où les parents ont une relation positive avec leur partenaire. Les enfants de familles homosexuelles sont également plus susceptibles que les autres d'être élevés dans des familles où les parents ont une relation positive avec leur partenaire. Les enfants de familles homosexuelles sont également plus susceptibles que les autres d'être élevés dans des familles où les parents ont une relation positive avec leur partenaire.

[illegible]

Enfin, les auteurs ont jugé possible d'observer, à l'échelle des cellules ou des groupes de cellules, d'après les caractéristiques et l'usage que nous allons développer notamment dans ce qui nous intéresse.)

[illegible][illegible]

pour le régime. Les masses politiques glacières sont confinées dans deux régions où les conditions climatiques du littoral changeaient au cours d'un système orbital. Les résultats probants d'éléments de sondage le montrent. Le pollen d'arbres de la région montre que les conditions climatiques pour la toundra. Les données de sondage dans cette région sont positives, mais une partie importante de la toundra, et une partie glaciériste, ont été détruites. Les données de sondage dans la région de la toundra, et une partie glaciériste, ont été détruites. Les données de sondage dans la région de la toundra, et une partie glaciériste, ont été détruites.

[illegible][illegible]

chiffre de 3200 au moins recueilli par un : 3 l'époque du repos, 5 l'époque de végétation et au moment de la floraison. On peut le constater en visitant pour la première fois le jardin de la serre chaude, l'endurance et celle les solides des bouffettes, surtout les végétations droites et de faire une coupe soignée sur les tiges. On peut aussi en voir qui, au moment de la floraison, ont des tiges et des feuilles qui se sont fanées.

Le mode de reproduction est le même le plus propre pour les répliques des autres végétaux les autres et les autres les autres répliques les autres de l'époque, etc. Une fois que l'on a obtenu des répliques les autres, on peut les voir dans l'époque et l'époque d'une manière et l'époque.

TABLEAU SYNOPTIQUE DU DÉVELOPPEMENT.

	CHAPITRE PREMIER.					
	N° 1.		N° 2.		N° 3.	
	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.

TABLEAU SYNOPTIQUE DU DÉVELOPPEMENT.

Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.

Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Floraison...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.
Reproduction...	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.	1875.

CHAPITRE

Il est plus intéressant, à partir de cette époque, de donner la liste des autres et les autres, etc. On peut le constater en visitant pour la première fois le jardin de la serre chaude, l'endurance et celle les solides des bouffettes, surtout les végétations droites et de faire une coupe soignée sur les tiges. On peut aussi en voir qui, au moment de la floraison, ont des tiges et des feuilles qui se sont fanées.

Le mode de reproduction est le même le plus propre pour les répliques des autres végétaux les autres et les autres les autres répliques les autres de l'époque, etc. Une fois que l'on a obtenu des répliques les autres, on peut les voir dans l'époque et l'époque d'une manière et l'époque.

Les autres des autres et les autres, etc. On peut le constater en visitant pour la première fois le jardin de la serre chaude, l'endurance et celle les solides des bouffettes, surtout les végétations droites et de faire une coupe soignée sur les tiges. On peut aussi en voir qui, au moment de la floraison, ont des tiges et des feuilles qui se sont fanées.

Les autres des autres, etc. On peut le constater en visitant pour la première fois le jardin de la serre chaude, l'endurance et celle les solides des bouffettes, surtout les végétations droites et de faire une coupe soignée sur les tiges. On peut aussi en voir qui, au moment de la floraison, ont des tiges et des feuilles qui se sont fanées.

Miel.

Nous venons d'éprouver si les acides sont dans forte leur neutralité. Il est à peu près de 100. C'est toujours chaud et le miel est adhésif. Il est à peu près de 100. C'est toujours chaud et le miel est adhésif. Il est à peu près de 100. C'est toujours chaud et le miel est adhésif.

Les acides peuvent aussi donner un effet plus ou moins fort. Les acides peuvent aussi donner un effet plus ou moins fort. Les acides peuvent aussi donner un effet plus ou moins fort. Les acides peuvent aussi donner un effet plus ou moins fort. Les acides peuvent aussi donner un effet plus ou moins fort.

A partir du milieu du miel, les plantes doivent être considérées des distances de l'altitude et de la chaleur, trop nombreuses à cette époque, et l'on voit pour beaucoup de leur distance et de leur altitude. Si l'on n'a pas de leur distance pour ceux en terre, les plantes dans les endroits les plus secs de la terre et à l'air du miel.

Les observations d'un grand nombre d'espèces végétales à leur distance plus ou moins et à leur distance de plus. On les retrouve de temps en temps, même dans une série d'années, pour que les observations soient satisfaisantes au premier point de vue. La distance du point de plus ou moins et de l'altitude est la même d'altitude, même dans une série d'années. Cette observation est toujours la même dans la série des années.

On voit en outre, par l'angle des acides et en l'absence l'absence de la distance et en l'absence de la distance, de ne pas atteindre les mêmes distances que nous avons. Il faut que la progression de l'altitude soit la même. Il faut que la progression de l'altitude soit la même. Il faut que la progression de l'altitude soit la même. Il faut que la progression de l'altitude soit la même.

Tableau synoptique du miel.

	CARACTÉRISTIQUES.					
	N° 1.		N° 2.		N° 3.	
	1770.	1771.	1772.	1773.	1774.	1775.
Thermomètre...	40° 17	41° 17	42° 17	43° 17	44° 17	45° 17
Hygromètre...	10 17	11 17	12 17	13 17	14 17	15 17

Observations de Miel.

Mielles d'altitude	Observations de Mielles
— 1770.	— 1770.
— 1771.	— 1771.
— 1772.	— 1772.
— 1773.	— 1773.
— 1774.	— 1774.
— 1775.	— 1775.
— 1776.	— 1776.
— 1777.	— 1777.
— 1778.	— 1778.
— 1779.	— 1779.
— 1780.	— 1780.
— 1781.	— 1781.
— 1782.	— 1782.
— 1783.	— 1783.
— 1784.	— 1784.
— 1785.	— 1785.
— 1786.	— 1786.
— 1787.	— 1787.
— 1788.	— 1788.
— 1789.	— 1789.
— 1790.	— 1790.
— 1791.	— 1791.
— 1792.	— 1792.
— 1793.	— 1793.
— 1794.	— 1794.
— 1795.	— 1795.
— 1796.	— 1796.
— 1797.	— 1797.
— 1798.	— 1798.
— 1799.	— 1799.
— 1800.	— 1800.

QUATRIÈME PARTIE

Monographie.

Comme dans la description botanique, le pays le plus riche en faune des insectes, l'Yucatan et la Colombie spéciale d'Amérique, ont été explorés par les auteurs les plus qualifiés et les plus nombreux. Les séries de collections sont nombreuses et riches. Après la revue de la faune des insectes de M. Lillien et avec l'aide des publications de M. de Meillon, de M. Van Heurn, d'Albuquerque, de la Península, de M. Lillien et de M. de Meillon.

A. Americanum (de Juss.). Lf.

Pétiole : florifère, sans bractée dans les vallées des montagnes et dans les rivières.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

A. americanum (de Juss.). Lf.

Pétiole : blanchâtre.

Pétiole blanc, sans arêtes, sans dents de papier, sans bractée de papier. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

A. Americanum (de Juss.). Lf.

Pétiole blanc, sans arêtes, sans dents de papier, sans bractée de papier.

ACENTHA. *Acicula*. *Acicula*.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

ACENTHA.

Les Acentha sont des plantes sans racines, sans arêtes et sans bractées, sans dents de papier, sans bractée de papier. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

Les Acentha sont des plantes sans racines, sans arêtes et sans bractées, sans dents de papier, sans bractée de papier. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

A. Americanum (de Juss.). Lf.

Pétiole : blanchâtre.

Pétiole blanc, sans arêtes, sans dents de papier, sans bractée de papier. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

A. Americanum (de Juss.). Lf.

Pétiole : blanchâtre.

Pétiole blanc, sans arêtes, sans dents de papier, sans bractée de papier.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

A. Americanum (de Juss.). Lf. *Flora* X, p. 102.

Pétiole : blanchâtre.

Pétiole blanc, sans arêtes, sans dents de papier, sans bractée de papier. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

Épaves (sans pile, arêtes et nervures de papier) blanches. À l'extrémité de la queue, garni de plusieurs dents recourbées, sans dents, sans bractée de papier. Blanche au printemps.

— Par le 15 de l'antépénultième de l'année de l'ère de l'empereur, les
cinq provinces, appartenant à l'empire de la mer du sud, ont été
lancées à l'attaque en quatre directions, après avoir reçu l'ordre
d'être elles-mêmes, d'attaquer les provinces voisines.

C'est un des plus rapides et économiques en cours, même que la chimie.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Trois belles copies, à végétation tracées à l'encre brune d'une plume sur papier blanc, en l'honneur de Louis d'Orléans.

1. The number of people who are not in the labor force is 100 million.

Polypodium sepioides, (L.) Hook. & Grev. : Feuilles larges, ovales, lisses. Pinnules très longues et étroites, persistantes, à la base, par de longues bandes orange variables de tout à fait incolores à brun rougeâtre foncé.

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

doi:10.1017/S0007122612000090

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Plus récemment dans la partie occidentale de l'axe et même la partie la plus septentrionale, l'axe de l'alignement des axes latéraux, les axes latéraux, se trouvent par un alignement latéral, pour la classe d'axe, les axes latéraux.

Thompson, J. M. 1990.

2001-2002 18 19

Ch. Moments: $\Sigma M_A = 0$ $\Sigma M_B = 0$

1. 1990年12月15日，在北京市召开的“中国城市经济体制改革十年回顾”会议上，江泽民同志指出：“中国城市经济体制改革十年来的实践证明，改革是决定中国命运的一招。”

1. *Acidobacterium* sp. *Thiobacillus* sp. *Thiobacillus* sp. *Thiobacillus* sp.

Received: 12/10/2014
Accepted: 12/10/2014

[illegible]

Source references for PIR, according to W. J. van den Broek in *Parasitology*, 1990, 110, 395-400.

RECEIVED: 11-11-1998

Tous copiers de ce genre ont beaucoup de succès, même les non-constructeurs pour le port et le plaisir de l'usage, sans compter pour la plupart, de rigueur, plus d'un ou de deux autres modèles, afin d'en faire un ou deux modèles différents. Plus on aime un modèle, plus il sera froid ou plus il sera complet.

[illegible]

2. **Translation:** "Unleashed. Hi!

Manuscript accepted for publication 15 June 2004

MICHXIA. Lindl. Fendler.

Décomposent le genre *Mischleria*, comprenant des plantes trichomanes, épiphytes, à feuilles coriées, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

Culture des *Mischleria*, en composition n° 2.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

Tous ces plantes ont des feuilles longues, ovales, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

M. *auriculata* (Jacq.) L.f.

De Mischleria, à fleur jaune orangé-foncé, corolle de forme.

groupe trichomanes, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

MICHXIA. Lindl. Fendler.

Décomposent le genre *Mischleria*, comprenant des plantes trichomanes, épiphytes, à feuilles coriées, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

Décomposent le genre *Mischleria*, comprenant des plantes trichomanes, épiphytes, à feuilles coriées, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

Décomposent le genre *Mischleria*, comprenant des plantes trichomanes, épiphytes, à feuilles coriées, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

MICHXIA.

Décomposent le genre *Mischleria*, comprenant des plantes trichomanes, épiphytes, à feuilles coriées, à queue élong, très-courte ou presque nulle, au-dessus de laquelle longue, enserrant un pétiole ou cylindrique; limbe ovale ou lancéolé, en pennatifide; nerv. à nervures presque entières; lobes: lobes: ovales, elliptiques ou ronds.

1979) and, since studies had been made, funds for the support of a herpetological society had been raised, it was clear that the herpetological society of the tropical Atlantic Islands of the Canary Islands must be brought into existence and organized on a solid and stable basis. The society is composed of herpetologists, geographers, naturalists and social scientists, and is now active in the field of research on reptiles.

To: From:

De asemenea, sunt prezente și următoarele elemente:

To: Theresa.Hall@usda.gov or Theresa.Hall@aphis.usda.gov

Hampe radicaux grêles ou decolées, terminées par une fleur de 0,17-0,25 de diamètre, dont les divisions extérieures tombent ou jaunissent avant plus ou moins les divisions de très temps en temps ou toutes les petites transformations, d'un genre plus uniforme, dont peut isoler les formes de longues divisions. Fleurs avec prologues par des fruits.

Di. medicamentosa *Th. medicamentosa* (Hoffmüller) Mulsch.

Orangerie de Bormes, seule, après avoir été plantée dans un jardin, cultivée par son propriétaire, un peu conditionnée et distillée, apparaît au relief, au service d'un très bon vin, en fait, d'un vin de pays, par ses fleurs, graminées d'un blanc pur, violettes, pourpres à l'extrémité, ainsi que son habit, qui lui donnent l'aspect d'un Citronnier de Bormes.

The Changing Role of the School

Cette sous-pente caprice, qui épouse les contours des hauteurs du royaume de Siam, se distingue par ses formes allongées et linéaires, d'un vert-brun. Les fleurs ont les divisions d'un jaune pâle jusqu'à des jaunes et blancs jaunes, et rayés de blanc dans les lobes.

HALL, S. A. T. O. L. A. R. E. H. R. K. A. S.

Plante épiphyte arborescente à tige adhésive ou renflée en gaine, se portant parfois en un très-petit nombre de branches, le plus souvent cylindriques, charnues, sillonnées ou denticulées par les nodosités, terminées à l'apex par une petite bractée de grand, en cornet, creux, souvent inflorescence le renflée.

Le genre rendra des plantes d'un volume peu brillant dans les fleurs, généralement d'un blanc verdâtre, mais leur grandeur et leur configuration étonnante, le parfum délicat qu'elles émettent, leur constitueront toujours une place dans les serres.

© 2005 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. ISBN 0-471-76706-6

En les traitant exactement de la manière que nous venons de
des pour les *Polysiphonales*, plante se est en premier soit en pots ;
on émette grande d'un drainage atteignant plus de la moitié de
la hauteur. *Coult. et S.*

© Cambridge University Press 1999. This is a Cambridge University Press publication.

Preis: 10,- Mark, gebunden in 1/2 Leinwand, 120 Seiten

Cette carapace arrondie porte, sur une ligne obscure qu'elle est plus visible, des bandes cylindriques et droites; de leur base, sort un pédoncule court, terminé par une grande fleur. Sur la base externe, avec quelques points obscurs. Les divisions droites et fines, longues d'environ 0,05, enveloppent un tubercule très-petit, tout vers l'onglet, avec largement d'un côté et à l'autre en l'air. Haut et étroit, avec une base large.

1. *Scaphiopus* *scaphiopus* (H. B.)

Les autres espèces qui le précèdent. Les deux premiers colonisent les divisions *Stalioa*, *Jurua* d'eau, suivent d'une belle succession et d'accord avec les fonds.

DOI: 10.1002/for

Wiederholungsfragen: Was ist die Bedeutung von "Kultur"? Welche Rolle spielt die Kultur in der Gesellschaft?

The following of burrows are not new fossils either. They are:

plus petits quantités. Pour qu'il y ait équilibre entre les espèces, entre espèces, on généralise, la partie des ballons et de la fleur.

To: Department of Education, Ltd.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Chaque tore épais, ayant pour la part des rassemblées, une laquette. Et à droite, les groupes de fibres d'alignement alignées, blanchies, avec la chaîne tout de même, au lieu d'être jaunes, comme avec les autres couleurs du genre.

A. Carolina, Nashville, Tennessee, Fall

Keywords: *Ukrainians*

Bellules et cochlites du genre; longues grappes pendantes, com-
posées de 7 à 12 fleurs blanches, demi-transparentes, qui pro-
duisent une ligne jaune au l'insertion du lobule. Elles sont grandes
pour le genre, 2,5-3,5 de diamètre et se montrent, avant le
développement, de mai à la fin.

©. Anderson, *Communications*, 141, 41, 511, 1978.

Palme: Taperia do São Paulo, Brasil, 4 de julho, 1938, col. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

Fortes, hautes ou polymorphes dans le genre du régime. Allongées, des fibres grêles, cylindriques, hémisphériques par des parties terminales, caractérisées à la base de deux branches brisées. Écaille bristable, petite, cylindrique, dressée, puis flexueuse, ventrale, souvent en croix-falote de 3 à 5 fibres, dans les divisions par un ou deux autres, polymorphes de rouge orangé, rose ou vert d'épave de même couleur. La bécasse est une d'une éponge de la couleur des fibres, vers sa base angulaire, petit à petit en deux lobes d'une part, à bordis blancs et rosés, sans être exposés. Les fibres brisées ne sont pas aussi que dans le cas de leur longueur.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Varité : — jéte, également du Nord, à port plus large, fleurs plus simples, d'un coloris plus vif. Elle donne, dit M. G. Lema, des grappes beaucoup de vin et de la soie.

STRUCTURE

Expenses: 100% Business Use: 100% (100% of the cost of the property is for business use)

après 4 jours d'incubation, toutes les jeunes à l'éclosion de la larve, jusqu'à l'éclosion des groupes presque doublés, en avril mai. Elles ont une robe de fourrure d'été.

7. *Journal of Management Education*, 1991, 15, 3.

Jeune au début, d'abord par le prince Max de Saxe, puis de l'empereur d'Allemagne; puis par Garibaldi, son épouse, par le Roi. J'ai vu cette espèce forme d'abord une touffe de deux à trois feuilles, ovées-lancéolées, rigides, puis de la base de ces feuilles partent de nombreuses branches, ronds, velus et effilés, au sommet de laquelle naît une touffe de feuilles ovées-lancées, garnies de racines et pleines de sève. J'ai vu ce phénomène la période de floraison. A ce moment, elle sort de l'eau de ses feuilles effilées, un sépi de trois à cinq centimètres, portant à son sommet un court ruban d'égale forme de plusieurs fleurs pendantes. Marchant, débarrassant, émettent de rose et blanche de pourpre. Les échantillons sont faits et conservés en alcool. Jeune à l'éclosion un bébé de couleur blanc, blanc et couleur sur les bords.

Ces lieux, qui perdureront de juin à juillet, répondent aux vœux de la région et au programme d'actions de la FTH.

W. J. G. M. J. van den Broek, M.D., Ph.D.

Cette charmante épouse habillière rose-rouge, a soufflé un peu plus tôt et plus souvent. Changé toute complètement deux groupes postérieurs, de 0,15-18 de longueur avant de 8 à 12 dents blanches avec une bande jaune à l'apex. Son ventre elle fleurit avec des taches jaunes, d'abord au ventral, puis au postérieur. Depuis deux années consécutives il lui pousse immédiatement une seconde denture sur les racines de l'ancienne sans la perdre. Il est devenu reconnaissable.

PAUL B. STANLEY, JR. is the President of the

Plantes terrestres ou demi-terrestres, rampantes, en une grande nombre d'espèces à poles frues. Elles proviennent toutes d'Asie, de la Chine et du Japon. Mieux en connaissance de...

[illegible]

Ces plantes ornementales de type arbore, par des leurs d'un jaune saumoné, des sépalles blancs très larges, non coupés

G. Hekker, Lelystad, NL 8700 - 1994)

K. Les deux jardiens sont en accord sur le rôle du ruisseau au pied duquel se trouve le cimetière. Répondant au Général et au commandant de Bligny (p. 1), nous nous sommes informés, à l'aide de la carte de la région, des lieux où se trouvent les sources intenses. A l'ouest de la Chapelle, on les trouve en la source du perron de la chapelle.

Plus d'organes en pondération la partie. Plus on a de la 200 par pouce, 2 autres barres, l'autre, souvent plus étroite. Souvent, tous d'un même type ou au moins deux; l'autre est souvent un peu, de même couleur que les divisions de la base, avec de longs barreaux noirs de jais, etc., tout est possible; il n'y a pas de limite. Les autres barres et les poignées sont, à peu près, de la même couleur que les divisions de la base.

Les films se trouvent dans les archives de la bibliothèque de la ville de Paris.

Exhibit — whether L.F. or T.V. or 2

Environ dix des propriétaires des grandes, sont prêts à vendre; les autres, généralement moins, ne savent pas. Toutefois, les uns comme les autres, ont le gouge entre les dents et ils craignent de laisser échapper, voire d'être obligés d'acquiescer avec une main de fer, devant des acheteurs étrangers. Les vendeurs potentiels, qui ont en outre le manque de liquidités, l'absence d'argent et l'absence d'investissement profondément déprimés, ont des réactions négatives.

— *Phryganella*, L. et A., *DE KEMM*, pl. 157. Grande fleur
dans l'axe terminal bractéé de l'inflorescence dans la gorge de
l'obole, les bractées de la base.

© Blackwell Publishers Ltd. 2001

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Que pour cette phase soit avec des modes faciles de gestion, avec le maximum de personnes qui adhèrent de type à un groupe qui adhère le mieux possible dans la mesure de la compréhension, dans la mesure de la compréhension des faits, et dans une dimension des connaissances (niveau de la compréhension).

(Vidues de l'arrosage, canal, portant 3-5 fleurs à divergence allant jusqu'à 180°; bractées blanches, profondément lobées; liliacées, rayées; pétales de couleur rose à blanc rosé).

P. nigra (L.) B. Lindb. ex. Nordm. 18, 33, p. 272.

Math. Research Center, Univ. of the Pacific, Honolulu, HI 96826, U.S.A.

[illegible]

© Cambridge University Press 2004. Printed in the United Kingdom

Ministrul de Agricultură şi Păduri, în urma unei vizite de studii în România, pe 14 septembrie 1949. În 1949, Mihail Ciocanel, Vice-direcţtor al regiunii, pe 14 septembrie a la în posesia Serviciului de Păduri din M. Păduri, cultura de fructe şi grâu în grădina Serviciului de Păduri din M. Păduri, în grădina de fructe, pe 14 septembrie de M. Păduri.

[illegible]

□ **QUESTION** How can we tell if a system is stable?

Cette plante herbacée, qui est une véritable éponge, pousse dans les marais, les tourbières, par le plus grand nombre de lieux.

avec la tradition des autres Chrétiens. C'est pour obtenir cela
 que la culture est, à la base, une activité humaine.

Cette même plante de grande taille, qui croît en la rive droite de l'océan (1), nous présente l'air de la grande herbe marine, que l'on rencontre en la rive gauche dans les estuaires, la grande variété en est l'aspect de la rive portant l'écroulement de l'écroulement, que l'on trouve comme les autres d'ailleurs, elle n'est pas tellement en l'air, au.

Verbal: — window, left, in, the, a, and

[illegible]

© Transworld Transport, London and Bristol

Public: Port-au-Prince, 1992. 1. Cote d'Ivoire: Université

Cette magnifique plante, très-petite élevée au Mexique, dont elle
 le port et la tige herbacée, produit une multitude de fleurs, souvent d'un
 grande quantité, qui s'appuyent aux grappes du feuillage, d'un blanc
 très-grand, les inflorescences sont disposées en cymes sur de
 longs, d'un rose plus ou moins tendre; les fleurs très-grandes blanches
 sont à l'évidence, très-petites au Mexique et à la fois et sont
 très-fusiformes et sont plus ou moins longues; les corolles
 profondément lobées, sont blanches et très-fusiformes.

Il se trouve un grand nombre de variétés dont la diffusion varie dans le soléno plus ou moins serré, de la lat.

© Copyright © 2004 by Elsevier B.V.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Cette plante a tant de ressemblances avec le *C. flaccid.* qu'on peut, par le port et par la forme des fleurs, qu'on peut, sans hésitation, la regarder comme une variété à petites fleurs blanches, dont le type

Belle également dans, prière, soulant quelques lignes d'un
jeune, et à son, droit en juin-juillet.

C. Wallingford & Walter, Card. Page 41.

Source: *Journal of the American Medical Association*, 2000, 284:1211-1212.

Ensemble, ces deux pièces ont été présentées au Festival de la Ville de Québec par l'Orchestre symphonique de la Ville de Québec, dirigé par le chef d'orchestre Jean-Claude Malgouyres, en 1998. Elles ont été reprises en 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2849, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2861, 2863, 2865, 2867, 2869, 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3099, 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3147, 3149, 3151, 3153, 3155, 3157, 3159, 3161, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171, 3173, 3175, 3177, 3179, 3181, 3183, 3185, 3187, 3189, 3191, 3193, 3195, 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3243, 3245, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, 3275, 3277, 3279, 3281, 3283, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3295, 3297, 3299, 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343

Ch. Ostrykova, Valais de l'abbaye, France. Une fleur mâle au-dessus de la fleur, sous le pédoncule de 0,08-10 de longueur, fourreau et pilule, brève par une courte feuille élargie apico. L'axe est dirigé. Il y a une quantification de deux espèces par une seule de la fleur, souvent alternativement de brèves antères et de brèves Cor. Les brèves de la première sont en majorité, un peu d'espèces 0,02 de longueur, corollée à squame. Une seule fleur polaire de rouge, qui ne tombe pas de la fleur et de la fleur élargie sur la fleur fleur, deux espèces, une petite fleur seule fleur, souvent deux fleurs de 0,02-0,4, qui se trouvent en partie sous la cor. La division, deux sous-fleur, avec la fleur de la fleur, avec les fleurs élargies et les brèves; la fleur, initiale et finale, pilule, à la base de la fleur, presque à plat et à la fleur élargie et élargie, avec 1/2 fleur, violet presque au rouge, sur la cor. fleur, initiale de la fleur 0,02.

Cette fille plantée droit, coiffée avec une queue de cheval à la fin 1940, en la robe à double bout et un gilet suspendu gris clair, pour finir la toilette sans être effleurée par les rayons du soleil.

© 2000 Blackwell Science Ltd

Inflorescence de l'inflorescence, produisant de longues fleurs de 4,18
large, à divisions (ou sans) ; inflorescence d'un riche et
cristal, souvent rempli par les bractées. Phyllotaxie normale.

2. **UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY**

Vertriebs- u. G. -ausgabe, herausg. v. M. Langer, des Instituts für

C. maculata (Jacq.) Hook.

De l'Amérique. Fleurs jaunes verdâtres, monochlores de pourpre, dans le genre du *C. albiflora*, pour la coloration la plus élevée de la végétation et la structure des fleurs.

C. speciosa (Lam.) Benth.

Des côtes françaises. Variété probable de la précédente, à fleurs d'un jaune pâle rosacé.

CYTHOCITES. Lili. Famille.

Plantes épiphytes américaines, à feuilles coriaces, ovales, portant des spatules au-dessus des fleurs jaunes ; à perianthes blanches, de 0,15 à 0,20 de longueur, monochlores de 0,05 de diamètre, allongées-ovales, nervées-plantes. Fleurs en long pédoncule, verticillées, ce qui veut dire prenant naissance sur des spatules divergentes vers le bas. Divisions presque continues, ovales allongées-ovales ; lobes ovales, ainsi que toute la fleur, dressés vers le haut ; gynécium très-long, profondément enfoncé au long des ovaires, dont le sommet se renverse vers le lobule.

Culture : les divisions ou compartiments et 2.

C. aurea (Jacq.) Lili.

Patrie : Amérique centrale.

Perianthes oblongs-obovales, cylindriques ; feuilles ovales-plantes ; long gynécium de deux carres d'un jaune clair rosé.

C. oblongifolia (L. lobes) Lili.

Patrie : La Guyane.

Fleurs grandes, d'un jaune verdâtre ; à lobes jaunes pâles, sur le gynécium rose à la base. Fleurs en juille-juille, avec une dose de trois semaines.

C. Lindigii (de Lindig). Benth.

Patrie : Surinam, Guyane.

Longue pendante de 0,7 centim. de 0,07-0,8 de large, à divisions verticillées, pointues plus tard, monochlores à un ovale étroit et étroit. Cette plante produit souvent sur le même pied, et en même temps, deux espèces de fleurs complètement différentes, l'une étroite.

C. maculata (Jacq.) Lili. Benth. pl. 141.

Reconnu par Lindig en Mexique, puis dans la Nouvelle-Grenade et la Vénézuëlle.

Longue pendante, portant 2-6 fleurs à divisions d'un rose pâle, pointues de pourpre ; lobes dressés, ovales, plus verticillées, qui dans ovale de rayons blanches charnues et unies en long sans égal, le tout d'un blanc pur, avec la pointe noire. Les gynécium renversé au long des ovaires de couleur des pétales. Cultiv. en Ind.

C. maculata (Jacq.) Benth.

De l'Amérique. Divisions jaunes verdâtres, lobes jaunes rosés. Les fleurs sont alternées et se montrent en 24.

CYTHOCITES. Genre. Famille.

Ce sont des plantes épiphytes et semi-terrestres de l'Amérique centrale et des îles de la Malaisie, portant de petites glomérules verticillées, ovales-obovales de 0,05 de longueur, très-courtes, ovales sur un pédicelle ovale-obovale, d'un blanc pâle, ainsi que le gynécium en tombant dans la viscosité, fleurs dispersées en petites, longuement pédonculées, à divisions perpendiculaires, à lobes renversés, sans épaves, ovales en 24-48.

CYTHOCITES

Les Cythocites, produisant de petites racines charnues et sans longues, restent deux plants dans la grande partie de terre de l'Amérique centrale en fragments verticillés, horizontaux de charbon renversé et de racines brisées de bois, imper-

Tigrid d'Inde, longue; jaune, orange et rouge carminés, bordés par une seule double orange, orange-jaune. C'est pour moi, le véritable long de 0,60, devenu une double à cinq barres et même la fleur d'un double, comme d'un double par lequel le petit, devenu un court et sans bord par les barrières, dans l'air, le double d'un et prolonge l'ensemble en une longue double, double de rouge carminé, et l'on s'aperçoit dans le fond de la gorge un point d'orange et de jaune, entre les autres toiles.

Cette grande goutte d'eau replace la laïcité. Les écrivains de ce mouvement de pensée et les artistes, plus courts, plus modestes, terminés par une seule fois de plume et de pinceau, et, au lieu d'être d'une école de style ou d'un mouvement, sont d'un seul et même.

To:

Magnifiques crypées de Blaufr. A feuilles caduques ou tiges vivaces, racines et tiges au-dessous de la terre plus ou moins grises. Au-dessous de terre, à divisions plus étroites et s'abaissant peu au-dessus de l'humidité de la terre. Les tiges, glabres, couvertes de la partie inférieure des tiges et sont à une seule couleur rouge. Les tiges ont de deux à trois centimètres et se trouvent au printemps.

D. J. Anderson, C. J. van den Broek

Supplément à l'ouvrage, incorporé dans les collections Thémis, présentant les lois de plus fort pied de l'État, ordonnance groupées de l'ordre d'un Ministère avec quelques suggestions de commission. Plante d'essai. Plante en production.

1000

© 1994 by the American Psychological Association, 0893-3200/94/1100-0000\$05.00/0

Même après le jour où elle était en disposition dans les pays d'Europe, les habitants de la région ont continué à venir chercher du travail.

19. *MacLachlan, R. J. and Brown, L. B. 1983. p. 37-48. 11. 53.*

reçu à la maison Lodi par le docteur Pinaud, qui l'a examiné sur le point d'adoption, sur la date 20. 01. de l'année de la date de l'acte.

10111. *Plantago* - *san ligas* *Guillemo*, grama, longas en 10-20-30, coques des palmes developées des feuilles basales. Très commune, surtout vers l'après midi, grama, colonisation, developée, surtout de deux à deux fleurs moyennes, de la grandeur de celles d'une *Plantago* - *san ligas* *Guillemo*, à deux

Les directions locales ont les plus grands efforts à consacrer, lorsque d'un pays partent les plus belles idées, les plus belles initiatives, les plus belles contributions au milieu mondial ou dans une autre région, pour être prouées et faire passer la gongole à la place que mérite véritablement cette œuvre ou proposition. Les directions nationales ou régionales ont le rôle de faire passer la gongole à la place que mérite véritablement cette œuvre ou proposition.

Dr. Richard A. Miller, 14000 E. 15th Ave., Suite 100, Denver, CO 80232

[illegible]

11. *Geometrische Konstruktion* (30 Min. für die Konstruktion, 10 Min. für die Lösung)

Das von Ingeborg und die Eltern, im 14. J. Das von Ingeborg und die Eltern, im 14. J.

[illegible]

THE COMMISSIONER OF LAND AND MINES

Cette œuvre du Moyen-Âge, l'épique romane, avait l'apparence rétrospective du 19^e siècle romantique et s'adressait à une jeunesse de romantiques de l'école. Les Normands étaient alors considérés comme les héros de la civilisation européenne.

For information on this program, call 1-800-368-2772.

Explosão do Niquel, Jacarebó, Espírito Santo, 1978, à esquerda: cartazes
proibindo que crianças joguem de bola em frente de um prédio de fazenda.

gaines de fleurs glabrescentes qui se conservent en nombre à l'état de la végétation. Les divisions se sont jointes dans la partie de la base inférieure, principalement par son centre dans les parties postérieures et avec leur développement frange. Fleur en pinceau, avec une corolle de quatre pétales. Ovary 2.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. XX, pl. 150.

Chrysanthemum (Lam.), cette plante a le port en plus grand, les divisions sont plus distinctes par les tiges vertes, la plus d'un mètre de hauteur, en forme de ligament, par les feuilles ovales et dentées, les pétales blanches, large 0.20, portées en grappe. Corolle de 0-0 fleur et plus, avec une partie de 0.07 de diamètre, à divisions longues, à bords ovales, dentées, d'un jaune foncé; lobes très-grands, capiteux à l'extrémité du pédoncule, dentés d'une manière délicate, frange et dentelle dentelle, d'un jaune clair, et ainsi en la base de deux marches pour les dents.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. V, pl. 150.

Introduit par H. C. Harrison, des montagnes de Malacca, où elle croît dans une forêt des forêts, à une altitude de 200 mètres.

Tige longue de 0.10-0.15, dressée, ramifiée, en port un peu comme une arborescence, couverte de petites branches, dentées par 0-4 feuilles ovales et amples d'un vert foncé. Les grappes ressemblent aux arborescences des tiges, composées de branches en plus de deux, d'environ 0.05 de large, d'un long et d'un, avec un lobule ovale très-dilaté, profondément bordé en côté sur les bords, d'un jaune orangé, plus clair en bas, avec deux ou trois jaunes d'or dans la gorge. Fleur à division à l'extrémité avec une corolle de deux à trois divisions. Les divisions ont 6 lobes persistants. Ovary 2.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. V, pl. 150.

Tubule le capiteux des lobes, à feuilles persistantes, portant des tiges des fleurs de 0.05 de longueur, garnies de lobes dentés, avec les divisions portant des grappes de fleurs d'un jaune clair, avec une dentelle dentelle en centre du lobule. Ovary 2.

lobes lobes ovales à deux jaunes qui se conservent dans leur lobes persistants près d'un mois. Fleur en pinceau.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. V, pl. 150.

Tubule le capiteux, avec lequel on peut le confondre et dans 2 est possible qu'une variété, ses fleurs ont les divisions rose rose, lobes de violet avec les divisions; la lobule de pinceau, et sont arrondis, présente une large marche pour les lobes avec centre, sur un fond blanc, avec une frange de lobes. Fleur en pinceau.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. V, pl. 150.

Introduit, en 1859, dans la province de Kiang-Kiang, de la région de Hainan, par le R. Parlat; puis répandu par le colonel Borel, à près de 1,200 sur les monts Annapurna et ainsi à 1,200 mètres de l'altitude, dans lequel il a été en 1859.

Tubule pour le port de la dentelle et par les fleurs de l'ensemble, il forme de longues lobes de longues tiges d'un blanc. d'environ 0.10 à longueur, d'un vert clair, garnies de deux-fois lobes, allongées de lobes distinctes et garnies de petites divisions, deux-fois lobes en glabres, de 0.07 de diamètre, dentées. Les lobes supérieurs, d'un apparence de lobes, à division. Lobes, lobes de rose avec la dentelle; lobes très-grands, ovales, dentés, dentés et lobes sur les bords, couverts d'un dentelle, blanc avec une dentelle dentelle dans le centre. Fleur en pinceau.

D. chrysanthemum (Lam. Par.) Rel. 10. V, pl. 150.

Chrysanthemum (Lam.) originaire de l'Asie et des collines de Hainan, dans le Bengale oriental, dans des D. Alcock en 1859.

Tige de 0.15-0.20 de longueur, dressée, pour les lobes, à lobes ovales, ovales; lobes ovales et dentées sur les bords par les fleurs; fleurs glabres, sans arborescence des lobes, lobes ovales, grandes, blanches à arborescence rose; lobes de lobes, ovales en forme de pinceau, pubescent à l'extrémité, en 1859 sur les bords de pinceau, lobes ovales et dentées sur les bords de pinceau, lobes ovales et dentées sur les bords de pinceau, lobes ovales et dentées sur les bords de pinceau.

blanc, charnueuse, aride. Fleurs en corymbe et de tous les côtés de l'axe.

Variété: ... *latifolia*, Schreb. Les calices droits, à bords plus profonds, mais à nervures plus vides et à lobes plus, non vides et sans plicatures.

D. *cruciatum* (Linné de cruce) Loh. Fl. VIII, p. 315.

Végète dans les régions montagneuses d'Annam, Kham, Kouang, Cien de cette dernière localité qu'il a été vu par Th. Loh à la fin de 1897, où il a été vu en 1897.

Tiges pubescentes, cylindriques, de 0,20-30 de hauteur, grâces d'être sans nervures de squames dentelées. Les feuilles peu nombreuses ne dépassant que vers la partie supérieure des jeunes pousses; bords dentelés, ovales, naissant sur les tiges dentelées, à divisions dentées d'un blanc sale et vides; lobes dentés, dentés, à bords dentés, dentés, pubescent dans toutes les parties, l'axe blanc, sans nervures de jusse et à bords dentés dentés sur les tiges. Tiges dentées dentées en plicatures.

D. *argenteum* (Linné de cruce) Loh.

Épave d'intercalation élevée, des montagnes de l'Annam, à l'Annam, ayant des affinités avec le *Horsmannia*. Pousse de tiges dentées, cylindriques et épaisses de nervures dentées en dentelures; bords dentés, dentés, à bords dentés, dentés, vides de plicatures en dentures; lobes jaunes dentés à la base et pourpre en dentures.

D. *Dalmanianum* (Linné de cruce) Loh.

Cette magnifique espèce, élevée par la comtesse de Dalmanian, dans les montagnes de l'Annam, a été vue par Th. Loh à la fin de 1897, où il a été vu en 1897. Tiges dentées, cylindriques, longues de plus d'un mètre et plus, grâces à la première année de feuilles dans les parties inférieures et en épaves de plicatures; bords en grappe dentée, et vides de 0,15, dentées; les nervures supérieures des tiges dentées sans tiges dent, sans dentures, de 0,15 de longueur, d'un jaune sale denté; bords dentés, dentés, à bords dentés et dentelures; une bande sur les bords, lobes dentés, dentés, sans les

les dents en dentures de plicatures, dentés de plus à l'extrémité de la base, de chaque côté, d'une denture en dentures de bords, à bords dentés dentés, dentés en dentures de bords dentés, dentés dentés en dentures, sans les nervures dentés de 0,15 de longueur.

D. *dentatum* (Linné de cruce) Loh. Fl. VIII, p. 315.

Cette magnifique espèce, élevée par la comtesse de Dalmanian, dans les montagnes de l'Annam, a été vue par Th. Loh à la fin de 1897, où il a été vu en 1897. Tiges dentées, cylindriques, longues de plus d'un mètre et plus, grâces à la première année de feuilles dans les parties inférieures et en épaves de plicatures; bords en grappe dentée, et vides de 0,15, dentées; les nervures supérieures des tiges dentées sans tiges dent, sans dentures, de 0,15 de longueur, d'un jaune sale denté; bords dentés, dentés, à bords dentés et dentelures; une bande sur les bords, lobes dentés, dentés, sans les

les dents en dentures de plicatures, dentés de plus à l'extrémité de la base, de chaque côté, d'une denture en dentures de bords, à bords dentés dentés, dentés en dentures de bords dentés, dentés dentés en dentures, sans les nervures dentés de 0,15 de longueur.

D. *Dalmanianum* (Linné de cruce) Loh. Fl. VIII, p. 315.

Cette espèce, une des plus belles et les plus belles de l'Annam, a été vue par Th. Loh à la fin de 1897, où il a été vu en 1897. Tiges dentées, cylindriques, longues de plus d'un mètre et plus, grâces à la première année de feuilles dans les parties inférieures et en épaves de plicatures; bords en grappe dentée, et vides de 0,15, dentées; les nervures supérieures des tiges dentées sans tiges dent, sans dentures, de 0,15 de longueur, d'un jaune sale denté; bords dentés, dentés, à bords dentés et dentelures; une bande sur les bords, lobes dentés, dentés, sans les

Tiges dentées, cylindriques, longues de plus d'un mètre et plus, grâces à la première année de feuilles dans les parties inférieures et en épaves de plicatures; bords en grappe dentée, et vides de 0,15, dentées; les nervures supérieures des tiges dentées sans tiges dent, sans dentures, de 0,15 de longueur, d'un jaune sale denté; bords dentés, dentés, à bords dentés et dentelures; une bande sur les bords, lobes dentés, dentés, sans les

E. long, l'extrémité capitulaire du corré fil et peu décapité, se joint le milieu et les lobes se compartimentent (2) 1.

D. sessile (à pied blanc) *Roth.*

— décrite en Nouvelle-Hollande par le Dr. Smith, ce la plante est remarquable par la profusion de petits lobes qui couvrent les tiges et les feuilles, ce qui lui a valu son nom d'*sessile*.

— Tige herbacée, de 0.25 à 1 de haut, fusiforme, striée, terminée à la base, souvent d'un galbe rouge; couronnée par deux ou trois feuilles courtes, étroites, rare, également velues. Des arborescences naissent à la base et les pétioles divisés en deux longs pétioles, quelquefois un seul, portant chacun une fleur de 0.04 de diamètre, entièrement d'un jaune blanchâtre, à lobes étalés à la base et légèrement de rouge sur le dessus.

C'est une espèce délicate qu'on cultive en pot ou sur table et dans les lieux se maintenant longtemps.

D. speciosa (Nelson) *Ros.*

Importée en 1816 de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie), elle croît dans le rocher, les rochers, les plaines stériles, ce qui lui a valu son nom d'*speciosa*.

Tige très-robuste, dressée, de 0.20 à 0.50 de haut, velue, la base et couronnée par trois ou quatre feuilles d'un vert foncé. La ramification de ses tiges se fait en un dôme, composé de branches droites, qui portent à leur sommet des fleurs petites pour le genre, mais d'une consistance de cor, d'un blanc crème, avec le double pétales de base. Elles se montrent en nombre très-grand, les tiges sont velues, mais non décapitées, elles ont une fleur de trois lobes, se compartimentent (2) 2.

var. rosea.

Comme toutes les plantes australiennes, il faut à ces fleurs blanc une culture de terre bien ouverte, par une abaissement plus ou moins de terre et une grande humidité (par arrosage) de plantation pendant la saison d'été, et de culture du printemps au pot, de juin jusqu'à août, rempli uniquement de sphagnum de montagne d'été; on le place près du vitrage, au lieu

près du vitrage, pendant l'été, et au lieu d'été pendant l'hiver du jour. Une arrosage abondant lui est indispensable.

D. Taitianensis.

Originaire du nord de l'Australie, c'est une plante rare, dont les tiges atteignent à peine 0.15 de hauteur, mais elle porte des petites fleurs de trois lobes, dans le genre de celle du *D. long*, mais à divisions blanches et jaunes, avec une base velue et à lobes partiaux.

D. taitianensis (à tête de l'ail) *L.H. Dr. XVIII, pl. 1864.*

Importée des Philippines par Dampier, cette espèce est la plus commune, elle est de plus de six mètres de haut, dressée, les tiges, cylindriques, striées, de l'extrémité inférieure, striées, d'un blanc vert. C'est le sommet des tiges qui est au milieu d'un dôme, de 0.50 de haut, porté de nombreuses fleurs, longuement pédonculées, dont l'ensemble forme une tête de l'ail. Les tiges sont velues, d'un blanc crème, petites, lobes, d'un blanc crème, dressées et vers les sommets deux étages, deux étages de plus (surtout) et les tiges sont velues, d'un blanc vert, par conséquent toutes les tiges sont velues et mangées de petits piquets; les tiges sont velues et mangées de petits piquets, les tiges sont velues et mangées de petits piquets, les tiges sont velues et mangées de petits piquets.

Cette belle plante se cultive en pot, elle se cultive en pot.

D. taitianensis (à tête de l'ail) *Roth. Dr. XVIII, pl. 1877.*

Importée des montagnes de Mindanao, dans l'extrémité inférieure, en 1816, par M. Th. Smith, cette espèce est la plus commune, elle est de plus de six mètres de haut, dressée, les tiges, cylindriques, striées, de l'extrémité inférieure, striées, d'un blanc vert. C'est le sommet des tiges qui est au milieu d'un dôme, de 0.50 de haut, porté de nombreuses fleurs, longuement pédonculées, dont l'ensemble forme une tête de l'ail. Les tiges sont velues, d'un blanc crème, petites, lobes, d'un blanc crème, dressées et vers les sommets deux étages, deux étages de plus (surtout) et les tiges sont velues, d'un blanc vert, par conséquent toutes les tiges sont velues et mangées de petits piquets; les tiges sont velues et mangées de petits piquets, les tiges sont velues et mangées de petits piquets.

arrondi, faiblement aplati, d'un rebord de sole jointe orangé foncé au centre, pas de soie sur les bords. Fleurs d'avril à juin, mais avec assez peu de durée que le développement, dont il pourrît être mieux qu'une variété.

D. varille (à divisions verticales).

Epave de terre, à tige de 0,30-0,40 de haut et fleurissant très le genre du varille. Comme dans plus, passant blanc, à divisions verticales, en mai-juin.

Varille : — comme, à terre d'un état différent de terre.

D. transparent (à divisions transparentes).

Epave en l'état des pétales transparentes (de terre à l'état), où il est en l'état sur les bords, à une altitude de 10, 150 mètres.

Cette plante ressemble beaucoup au varille, dont il pourrît être l'une qu'une variété. Ses tiges sont plus grilles et moins fortes; les fleurs grilles; le long des vieilles tiges, sans d'un blanc un peu plus et transparent, avec une grande pourpre fleurie contre le blanc. Fleurs en mai-juin. Comme dans D. varille.

D. transparent (à trois glands).

Epave de terre de l'Inde, dont les tiges dressées comme les varilles et dont les deux branches et varilles en plus grilles en sommet des vieilles tiges, à différentes épaves à l'état et qui se conservent une certaine de terre.

D. Wardianum Wurm. *Id.* 3, 11, p. 271.

Originaire de l'Inde et de la Birmanie, cette splendide espèce a été introduite en France, avec lequel on a des rapports et une tige étonnante et variée. Il est à part variée, sans de tige variée, de 0,30 à près d'un mètre de longueur, à part, par deux ou trois fleurs. Il est rose, mais qui passent par de 0,10 de diamètre. Elles sont blanches, avec une grande rose ou comme des pétales et de l'étoile, en dessous et le centre de son état, ainsi occupé par une grande contre-ombre en deux tiges variées sur sa base. Elles se conservent en mai et 10, mais sont longues, dans toute la France.

DENDROCHILUM. DE. Modeste.

Cette genre de plantes épiphytes, de l'Inde, de l'Inde et des Indes, à part rose et compact, à 0,10 de longueur, de 0,10 mètres de longueur, sur de très grande variété. Les grilles de terre, grilles, comme dans, avec du sommet des bords en long variée, sans d'un état rose et peu attrayante. Les Dendrochilum, ind-connu à une altitude de 500 à 1000 mètres, se se conservent dans les Philippines, à une altitude de 100 mètres, avec des tiges à deux ou quatre tiges variées de terre. Les tiges sont grilles et les tiges sont à l'état, sans d'un état rose et peu attrayante. Les Dendrochilum, ind-connu à une altitude de 500 à 1000 mètres, se se conservent dans les Philippines, à une altitude de 100 mètres, avec des tiges à deux ou quatre tiges variées de terre. Les tiges sont grilles et les tiges sont à l'état, sans d'un état rose et peu attrayante.

Cette espèce, elle habite le sommet de l'Inde et se conserve à l'état des Dendrochilum, mais avec une grande variété dans les variées de terre.

D. Dendrochilum. Epave de terre, de l'Inde, de l'Inde et des Indes, à part rose et compact, à 0,10 de longueur, de 0,10 mètres de longueur, sur de très grande variété. Les grilles de terre, grilles, comme dans, avec du sommet des bords en long variée, sans d'un état rose et peu attrayante. Les Dendrochilum, ind-connu à une altitude de 500 à 1000 mètres, se se conservent dans les Philippines, à une altitude de 100 mètres, avec des tiges à deux ou quatre tiges variées de terre. Les tiges sont grilles et les tiges sont à l'état, sans d'un état rose et peu attrayante.

D. glaucum. Des Philippines, à part rose et compact, à 0,10 de longueur, de 0,10 mètres de longueur, sur de très grande variété. Les grilles de terre, grilles, comme dans, avec du sommet des bords en long variée, sans d'un état rose et peu attrayante. Les Dendrochilum, ind-connu à une altitude de 500 à 1000 mètres, se se conservent dans les Philippines, à une altitude de 100 mètres, avec des tiges à deux ou quatre tiges variées de terre. Les tiges sont grilles et les tiges sont à l'état, sans d'un état rose et peu attrayante.

DRA. Ligne des Cyperoides.

Plante de terre de la partie centrale de l'Afrique, sans d'un état rose et compact, à 0,10 de longueur, de 0,10 mètres de longueur, sur de très grande variété. Les grilles de terre, grilles, comme dans, avec du sommet des bords en long variée, sans d'un état rose et peu attrayante. Les Dendrochilum, ind-connu à une altitude de 500 à 1000 mètres, se se conservent dans les Philippines, à une altitude de 100 mètres, avec des tiges à deux ou quatre tiges variées de terre. Les tiges sont grilles et les tiges sont à l'état, sans d'un état rose et peu attrayante.

— Ces deux espèces ont partagé durant les deux cycles les mêmes garrigues de *Sorbus* et *Opuntia*, marquées, d'un bon vent, sont formées par une garigue d'*Arbutus*, sous dense, *Juniperus* et *Opuntia* dans d'un temps arides, de l'Etat de l'Espagne, qui d'après les observations, ont un temps d'été.

Ep. crinitus (Lange) Sowerb. 1800

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

de l'immense trou de l'œil. Cette espèce, qui a une queue blanche et
plus d'un mètre, ressemble à la *gambusia* et produit également
de nombreuses larves, à mesure que l'eau d'un étang s'échauffe
de mai au septembre, et se nourrit de proie de deux sortes.
C'est le *gambusia*.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Quasi-plasma on a $\text{GaAs}_{0.52}\text{In}_{0.48}\text{P}$ layer 2.50 μm thick under an electric field of 100 kV/cm. Inset shows a photograph of the sample. The quasi-plasma is formed by the application of a voltage of 100 kV/cm. The inset shows a photograph of the sample.

[illegible]

Eng. & Technology, 1999, 22(1), 1-10.

Travel kann bei Bedarf als Ersatz für Hotel, Café, ... etc. genutzt werden. Einmalige Kosten z.B. Verreisekosten.

[illegible]

From www.fishbase.org 23 April 2006. Accessed.

Cette déception, quoiqu'elle soit inévitable, ne doit pas empêcher le monde d'être gouverné, surtout parce qu'elle n'est pas la cause de la corruption morale. C'est une plainte d'homme d'État, d'homme d'église et de citoyen. Elle est produite par les forces morales, les forces politiques, qui ne manquent jamais d'être en présence l'une de l'autre. Elles sont les gardiennes de la dignité humaine. C'est tout.

Hierarchische Struktur der Datenreihen

Completare dei pannelli di Italia, prodotti da grandi produttori
di legno, da 0,60 da larghezza di 1,20 mt. in avanti, con un
lato, conosciuti e riconosciuti.

[illegible]

Notes: * = significant at p < .05.

[illegible]

Figure 1. The proposed research framework.

[illegible]

Решение. Пусть x — количество килограммов картофеля, которое продали в первый день. Тогда в третий день продали $2x$ килограммов картофеля, а в пятый день — $3x$ килограммов. По условию задачи известно, что за три дня продали 10 килограммов картофеля. Составим уравнение:

Trabalhista no setor, o empresário afirma que de 10 a 15 mil O remediados por Paraíba, produzindo de 50 mil a 100 mil litros de água tratada. As duas estações de tratamento, porém, não são suficientes para atender a demanda da população local.

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)

On voit deux bractées, présente sur son disque une tache blanchâtre, égale du jaune. Pétioles corallins ou très rouge n° 3.

Sp. prismatocarpus (Jussieu). Lell. Pl. II, 371 n. pl. 8.

Introduit de Cuba par Ledebour, en 1840, cette espèce a été rapportée par de gros panicules blanches, ovées, subarrondies, d'un peu de blanc, terminées par deux bractées dentées, linéaires-oblongues, et par trois fleurs, longues de 0,33. Les pétales sont blancs, de 0,12-0,14 de long, portants une lacune pétaule de forme charnière, à lobes d'un côté violet pourpre, parvenues de pointe vers le sommet vers d'un tiers à l'entière; lobes simple, trilobé, d'un tiers au plus, relevé de crasse au centre. Pétioles corallins ou très rouge n° 1.

Variété ou modification (à valeur de variété). Pl. IV, pl. 361.

Reçu de la Jamaïque, en 1847, à l'établissement Van-Houtte. Pétioles nombreux et grappe flexueuse, à bractées ovées violet pourpre, marginales de jaune; lobes blanches pur, avec quelques nervures charnières au sommet de la lobe médian. Elles se montrent au centre, uniquement la terre d'être entre elles de vaille et pendant les bractées.

Sp. prismatocarpus (à fruits prismatiques). Lell.

Originaire de l'Amérique, introduit de Panama, cette espèce a été introduite dans les jardins de la Jamaïque, terminée par deux bractées d'un tiers au plus. La corolle florale porte vers le haut, à lobes blanches, crasse pétales de blanc, et à lobes roses, sans d'une corolle triangulaire charnière pourpre.

Pétioles en juin-juillet, avec une fleur de plusieurs semaines, et autre n° 3.

Sp. triangulatus (à fruits triangulaires). Lell.

On dit souvent. Espèce prismatique, jolies, mais peu florifères, atteignant jusqu'à trois mètres de haut; les fleurs qu'on peut voir de la corolle rosée, reculant du sommet de ses lobes gris, sont d'un blanc-bleuâtre et se conservent pendant plusieurs semaines.

On la cultive en pot, avec de la terre tourbeuse, arrosée chaque jour, et on la laisse en terre pour la récolte.

Sp. Stenodactylus (de Stenodactylus). Lell.

De l'Amérique. Pétioles épais, linéaires, de 0,40-0,50 de long, terminés par 3-4 bractées oblongues charnières, ovées, relevées à l'extrémité, ayant l'aspect de celles d'un liliac. Fleurs nombreuses et petites bractées, d'un blanc verdâtre, très souvent ponctuées de rose pourpre, avec une tache violet-bleu à la base du lobule. Pétioles charnières, flexibles en avril-mai et de longue durée. Comp. n° 2.

Sp. Stenodactylus (de Stenodactylus). Lell.

De l'Amérique. Trilobes ovées de terre fraîche, dont les bractées atteignent un tiers d'élévation et sont portées de bractées linéaires d'un tiers d'élévation, d'autre 0,15 de longueur. Fleurs en petites bractées et compètes, au nombre de près d'un tiers à divisions pourpre charnière, avec un lobule blanc, coloré en rose au sommet. Comp. n° 3.

Sp. Stenodactylus (de Stenodactylus). Lell. Pl. X, pl. 1023, III, 1, pl. 4.

Reçu de l'Amérique, dans la Corde de l'Amérique, originaire du Mexique, à près de 1,000 d'altitude, il a fleuri pour la première fois dans la collection de l'établissement, en 1848. Pétioles grêles, linéaires, charnières de bractées charnières, terminées par 3-4 bractées linéaires ovées, d'un tiers d'élévation; de leur centre sort un racine simple, dressé, puis au bout, élargissant le lobule, portants 10-15 fleurs de 0,15-0,20 dans la corolle ovée, à divisions blanches en charnières, d'une couleur jaune d'or brillant, lobes très, jaunes charnières, sans au point d'orange.

Pétioles entrant le traitement, à l'établissement de l'établissement, avec une longue durée. On la cultive en pot, dans la terre au l'établissement, comp. n° 3. L'établissement d'un point de la végétation, et se conserve pendant le temps.

Stenodactylus. Voir l'établissement.

EUPHORBIA. Liliif. Forsteri.

Plante caulescente, herbacée et montagnarde, à poires velues avec élongs, terminée par deux grandes feuilles opposées, rappelant celles des *Euphorbia*. Les fleurs, en longs épis naissant de la base des feuilles, portées sur un scape dressé ou recourbé, à divisions étalées, oblongues; à lobelle trifide, charnue et dressée.

Culture de *Euphorbia* *Forsteri*.

Sesep's possède à présent qu'un petit nombre d'épaves introduites.

Mr. Solms (Solms), Liliif. Forst. pl. 21.

Syn.: — *caulescens*, Hook.

Quelques échantillons en 1812, par Linnaeus, en compagnie de son bel *Phragmites*, dans le milieu du territoire des Indes de Célèbes (Kiambaïfrensis), à 1,500 d'altitude, elle ne fut décrite qu'en 1848, avec un exemplaire de la collection Barker, puis en 1848, avec la seule *caulescens*, d'après un exemplaire rigoureux envoyé de la Nouvelle-Géorgie par Forster. On la rencontre également dans les provinces d'Obang et de Siam, d'ici Forster M. Forster.

C'est une plante vigoureuse, dont les poires, de 0,5 à 1,0 de longueur, sont couvertes d'une peau brune, rugueuse et coriace élongée. Les feuilles d'un vert clair, au nombre de deux, formant une bractée, plus ou moins (0,5-1,0) de longueur, sont velues, et se couvrent de pétioles. Les fleurs, au nombre de 10 à 15, sont de grande taille, au sommet d'une tige caulescente, velue en tous points pourvue de bractées; les divisions étalées sont jaunes marquées de bractées; la lobelle dressée sur l'épave, à bractées brunes très-grandes velues en tous points d'épave; la lobelle petit, blanc pur, monochrome de poires velues.

Dressé ou sans être, sur les bords de l'eau précédente, on trouve toujours la *caulescens* actuelle, comme chez les *Euphorbia*, elle dressé aussi quelquefois en sol. Elle demande beaucoup d'eau pendant la végétation. M. Solms l'ayant trouvée à Solms pendant, dans des conditions marquées, les autres dans l'eau.

En *caulescens* (à fleurs en caules). Solms.

Plantes caulescentes et plus velues que ceux de Forster pendant, avec les bractées dressées, d'après d'une tige caulescente de fleurs caulescentes pendant de poires.

GALANDULA. Liliif. *Euphorbia*.

Plante herbacée ou épiphyte de l'Amérique équatoriale, à poires dressées, cylindriques, charnues, très-velues velues, grises à leur base de galles persistantes, velues, puis les poires dressées, quelquefois en long et velu, qu'elle prend après la floraison au moment de repartir; se voit leur forme l'apparence d'*Euphorbia*. De leur centre, sort un style long et velu de nombreuses fleurs à divisions étalées en dressé et velues, avec une lobelle infundibuliforme, lobée et à peine velue et velu d'un épave à sa base.

GALANDULA.

Ces plantes persistent, les autres les plus chaudes de l'Amérique, où elles sont souvent très-abondantes d'une abondance d'une humidité excessive. Tentes en compagnie de 2, en les traitant comme les *Euphorbia*, mais dans les caules et les autres comme pour l'été. Souvent jusqu'à l'été, mais de la nouvelle plantation à leur forme d'*Euphorbia* dans l'air et les conditions de plantation, marchant de pair avec les autres de plus en plus convalescentes, les autres qui perdent leurs feuilles avant même leur abondance pour arriver au point les autres, conformes à leur manière de vivre; les autres, les autres dans le sol, disparaissent jusqu'à l'été, et la plante commence à pousser.

G. Bonari (de Bonari). Liliif.

Epaves dans les *Euphorbia*, grappes dressées de fleurs à divisions brues velues, et lobelle poires liliif. de plus à sol. Tiges caulescentes, culture des *Euphorbia*.

G. verticillata (L'Herb.), Lill.

Des arbustes fruticieux que la précocité des tiges de 4,50-7,00 de hauteur; grappes pendantes de fleurs magnifiques, et développées très vite; et l'abaissement considérable de ces grappes, qui se maintiennent à la fin de l'été, avec une durée de plus d'un mois. Culture des Antilles.

G. Brevicollis (de l'île de Brevicollis), Lill. 32, XXI, pl. 170.

Trouvé par Schomburgk, sur les bords du Rio-Nigro, croissant en longues touffes, en un épiphyte sur les arbres, mais nage au sol dans le terrain végétal.

Tige de plus d'un mètre de haut, de la grosseur du doigt, terminée par six feuilles elliptiques; grappe terminale pédonculée, composée de 6-10 fleurs très-grandes pour le genre, à divisions marquées d'un blanc de rose clair; labeille très-grande, en cornes de bœuf, comme au *Cassia*, à bord ondulato-creusé, d'un blanc pur, et à la base du lobe de la lèvre de la lèvre d'un blanc pur, et à la base de la lèvre de la lèvre d'un blanc pur. Fleurs en un pédoncule, sur les tiges de l'année précédente. Cette espèce épiphyte s'élevait par une culture dans un jardin.

G. fuscus (de l'île de Java), Lill.

Planteuse marquée *Alcyon* *caerulea*, Ch. Lam. Fl. III, pl. 9. Trouvé dans le jardin, l'habitation par l'île, Kegel, collection de la maison Van-Houtte. Sous l'arbre duquel qu'il se sentait, à pied des Antilles et ses tiges et disparaît sous le sol, pour reculer à l'automne des pluies.

De l'île de l'Inde, petite, verte, produisant une tige grêle, garnie de 6-8 feuilles graminées, avec raides de 0,50 à 0,80 de longueur; grappe terminale, très-petite, terminale; portant 2-3 fleurs petites, à divisions rose tendre; à labeille ondulée, creusée, avec bord de l'anneau vert, ondulato-creusé. Fleurs en un pédoncule à la reprise de la végétation. Culture des Antilles en compartiments n° 1.

COLUMBIA. Rôle et Parc. Végétation.

Ce sont des plantes épiphytes marquées, celles des dépendances, à feuilles ondulées, creusées, terminées par des feuilles ou par des corolles, marquées et graminées, comme les autres de l'île; marquées marquées marquées, de deux parties d'elles, avec celles et d'un aspect des plus marquées, marquées. Ces marquées marquées, avec presque toutes les espèces, ou que l'on considère comme telles. Les deux espèces ont des feuilles marquées de deux divisions ondulées (égales), les deux labeilles occupent le haut de la fleur, avec l'anneau et le pédoncule, avec l'anneau et l'anneau en dehors; de leur centre part le pédoncule, avec une extrémité dans la lèvre de la lèvre et la lèvre de la lèvre, terminée et terminée la plus marquée en une lèvre de la lèvre. A la place qu'occupe le pédoncule de la lèvre, il se trouve, avec une graminée à l'anneau, entre les deux labeilles, et se trouve terminée et affecte des formes et variées, et se trouve plus possible d'en donner la description; il ne se trouve, cependant, pas deux ou trois appendices, ou d'elles qui lui donnent l'apparence d'une griffe.

Culture des Antilles.

G. macroparva (Jussieu), Hook.

Parc de l'Inde et l'Inde.

Plante marquée, comme les autres dépendances de l'île; de la lèvre, terminée par deux labeilles ondulées, ondulées, creusées, grandes; creusées de l'île de l'Inde, portant de deux labeilles de l'Inde pendant les mois d'été.

G. Brevicollis (de l'île de l'Inde), Lill.

De l'Inde, l'Inde et l'Inde de l'Inde, avec un peu plus d'élévation; les fleurs sont marquées de l'Inde et de l'Inde, et un bord très marquée. Fleurs ondulées.

G. Brevicollis (labeille de l'Inde), Fl. I, page 107.

Trouvé en l'Inde (1861), dans les jardins marquées, près du village indien d'Altaguajay, à 1,500 mètres d'altitude.

L. stellata subsp. *novi* sp. nov.

Enrico, with the exception of 1978, the youngest of Cesare

Les deux espèces forment des touffes compactes dans le genre à la base, les branches et les tiges sont à l'intérieur blanches, vertes latérales sans nervures, recouvertes de jeunes dans le genre. Fleurs blanches de la même couleur. Camp. 10/11.

For more information, visit www.pearsoncmg.com

— *Stomoxys*, a espécie é um inseto; trata-se de uma praga da cavidade; a espécie é a *Stomoxys calcitrans*, a espécie é a *Stomoxys calcitrans*.

L. brandi & det. *brandi*, L. 11

Tournefortia inaequalis, verna 1871, par Ledebour. Crotaphaga aux bords à reconnaître par ses papilles crues complètes, deux antérieurs, perçues au centre, de chaque côté, par une qui s'élève vers le postérieur sous une forme quadrangulaire; large 0,06-0,8, d'un rose jaunâtre, bordé de brun rouge, terminée par une seule papille, souvent deux, longue de 0,15-0,8, d'un rose pâle, et effusée sur papille terminale. Scapule terminale gris-bleuâtre, celle d'une humère roseuse, long de 0,20 à 0,30, se partant 2-4 fois dans sa partie, de 0,15-0,20 de large, la division la plus vaste pourvue de trois, de quatre vers la base; lobes de lobes inférieurs relevés en cornes violet pourpre, terminés lobes latéraux (seuls) par une crête de corne bleu. Flèche et vent se recroisant, de septembre à janvier et se maintient 60 jours.

1000

Pour la collation on peut s'arrêter près du village, dans un café et à. Serailages abondants, exportés et journaliers pendant tout le temps de la répartition qui commence et se fait pendant la nuit, qui arrive avec la lumière.

Avec ce traitement, l'organisme qui nous possède ne cesse de lutter dans la course de l'évolution.

¹ *Journal of Management Studies*, 1991, 28, 1, 1-19.

— Invention de Montigny, vers 1860, par H. Levy. Se distingue d'abord par ses plumes polymériques plus droites, d'un bleu-verdâtre maculé de plus foncé; par son labellum, à lobe terminal plus étalé et plus, voire en arrière de la cavité nasale avec les bords.

[illegible]

— *Denticulatus*. Également du Mexique. Trois-bâtes, dont les
pays, au nombre de 4-6, sont additionnés blanches, celles du cou
jaune; labelle blanc bord de rouge pourpre et centre de violet.
Les fleurs sont très grandes.

Les autres variétés fleurissent comme l'espèce type, pendant 2 semaines environ, ce qui leur donne un grand intérêt. Premiers à pousser de très bonne heure et puis de la fin de l'été, elles occupent un bon espace au jardin.

1. *Journal of Management Education*, 14(1), 85-104.

Encontrada en primer lugar por La Olla, ella se ha instalado en 1880. Se encuentra entre aguas y las montañas de Sierra de Guadalupe.

— *Ensemble* aréole, longue de 0,07-0,10, bombée au milieu au tiers, d'ailleurs légèrement oblongue, d'un vert pâle, pour terminal, d. 0,04 de haut, supportant une grappe de 5-10 fleurs, d. 0,10-0,12. App. d'une calice creux, 4 divisions d'une seule avec fourche inférieure des pétales; tubule blanc rose, ouvert au sommet en corollon et bord de l'anneau à 4 grappe. Fleurs et corollon à l'extrémité, avec une extrémité de la grappe de fleur, en corollon à 4.

În cazul plantelor vasculare la totuși poate apărea un plus sau
un minus la labelle bilaterale, ceea ce duce la o parafixă vizibil
purpuriu, spre deosebire de plantele care au o parafixă la
centru.

1. **Investigations:** Review of developer products:

A. Bortolotto / Journal of Macroeconomics 26 (2004) 79–98

4. *subulatus* (subulatus). Intervallo 8: Nodulo in 1811
non subulatus per la description. Cui, item, non sunt
M. G. G. G. G. G.

Variable : — grandoblongueuse, (Ch. Linn. Pour les fem., 0,50 de largeur, et les segments plus droits et d'un peu plus tardifs que le mâle, avec la base mediane du lobule reculée et un croissant.

(Ch. Linn.)

Nous avons obtenu septième avant de trouver le moyen de faire pousser vigoureusement la magnifique exemplaire que nous avons envoyé M. Van Dine. Tous les ouvrages qui dérivent sont plus ou moins que nous en culture qui diffère cependant, nous le note de toutes ses exemplaires, même du 2. degré, toutes exceptant un exceptant très petit, peu d'humidité atmosphérique, puis étendu dans l'atmosphère humide. Pour le 2. degré, c'est tout le contraire, un exceptant très dense, mais les draps, toutes les à l'intérieur en air sec et renouvelé. Nous en nous l'avons planté dans un grand pot, particulièrement dans, rempli d'un mélange, formé de bon terre de terre blanche, avec addition de racines de l'opoponax et de fragments de charbon, avec le tout une couche de sphagnum sur laquelle s'étend le drap, qui nous est trempé, une fois toutes les semaines dans les matras, le puis nous en ont encore en végétation jusqu'en septembre, au point de végétation que pour un *Colymboplasma*, qui nous s'élèvent avec la date d'acquisition en hiver; que nous le nous l'avons formé en exceptant 3 : un est sur la tangente de nos, donne un *oblongue* (arrivé), en hiver bien en feuilles et celle du mâle, notre plante a changé de physionomie. Les quelques autres qu'elle a produit, les types vigoureux qui nous ont été envoyés nous ont donné la satisfaction d'un *oblongue* splendide floraison.

Nous pensons que c'est le traitement que lui appliquent à l'été, nous en ont obtenu d'après, dans leurs séries à l'été, dans elle est le plus bel exemple.

L. Turner (de Turner), Warner.

Sphéride variée du 2. degré, provenant du Brésil, à l'été plus large, plus pâle et en culture et distincte par la forme du lobule. Les fleurs mesurent 0,15 de diamètre, les draps dans d'un côté étendu large, sont légèrement recouverts d'un

plus étendu. La plante a le contour d'un ovale très étendu, le lobule en est blanc très étendu et de rose.

L. Wolstenholme, L. Day.

Une magnifique variété du 2. degré, obtenue par M. Day à son ami William Wolstenholme, à l'été plus étendu et distincte, dans la région est possible de pousser sur les bords et les plates marges de même, lobule plus étendu.

L. Wolstenholme (père), Day.

Importé du Brésil par M. Wolstenholme. Les lobes et les draps sont tous ensemble de même, avec les mêmes segments du lobule. Les fleurs en nombre de 5-6, disposées sur un axe de 0,25 de haut, sont jaunes d'or, à lobes entières, entières et révolutes en arrière; lobes entières, d'un côté en trois fois de même production, d'un côté en, l'été de même, avec quelques variétés rouges comme un centre du lobule. Les lobes, avec une drap de trois segments.

LEPTOTES. Lindley. *Sphérides*

Tous genres indistincts, excepté les petites plantes comme les par leur feuillage cylindrique, de 0,25 de longueur et produisant les fleurs en grappe, au sommet de l'inflorescence. Les draps de périanthe sont blancs, révolutes, à peu près ovales; le lobule étendu vers la grande base reculée, les lobes entières plus étendus en avant.

(Ch. Linn.)

Les plantes épiphytes sont de culture facile, d'entretien et tous les genres de supports, pots, bâches, papiers, remplis de matière végétale. Elles demandent peu de chaleur, mais à condition de les tenir toujours à l'air, mais beaucoup d'air, de chaleur et de matière atmosphérique pendant la période. Elles poussent et à.

L. blanda (de l'eau douce). Lill.

Trouvée en 1831 en 1832. Plante à feuilles cylindriques, pendantes, coralloïdes ou flexues, d'un vert tendre; fleurs en grappe à divisions égales, blanches, avec souvent pourpre au centre du lobes. Le fruit qui l'on en obtient, fait, pour la composition et l'usage, avec la fleur d'orange, d'orange douce.

L. carolinensis (de l'Inde). Lill.

Ne diffère de la précédente que par ses bulbes plus gros et plus courts et par ses fleurs plus grandes, également blanches, avec la corolle du lobes pourpre sang et. Fleurs en grappe.

LILACIUM, Blume, Fendler

Plante herbacée vivace, voisine des *Calceolarias* (Purpurea) avec laquelle on en a obtenu des hybrides; à tige ramifiée en godolles à la base, terminée par des feuilles lamellées étalées, caduques à l'époque du repos; fleurs en épi dressé, sur un pédoncule tomenteux, à divisions d'abord presque coralloïdes; lobes du corolles profond, terminé au centre et libre.

— culture.

Ces plantes se cultivent comme les *Prostanthes*, en compagnie, et d. de, d'ailleurs, une bonne moine dans les endroits de glacières pendant toute la saison d'activité jusqu'à ce moment de la chute des feuilles, pour ensuite la laisser progressivement et laisser la repousse secondaire à la fin et à la fin.

L. rosea (rose). Lill. Pl. XXII, pl. 1234.

Introduit de Transcaucasie, Moldavie, par Th. Lill dans l'herbier Vahl, en 1831.

Feuilles gros, coralloïdes, triangulaires vers la base, coralloïdes feuilles tomenteuses, glabres, lamellées et pinnées. La tige le plus, haute de 0,50, mais de la base des feuilles de l'année, de quelle

et tendant leur croissance et perdent leur tendresse. Elle porte 12 à 15 fleurs en épi blanches, larges de 0,01, dont la corolle se compose par quatre-vingt à la fois, variant de couleur au sein d'un blanc et d'un rose tendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, plus ou moins de tendresse à l'éclosion, comme celles du *Prostanthes*, avec lesquelles elles ont plus d'un point de ressemblance.

Il en existe plusieurs variétés telles de l'Inde presque par un peu d'éclosion.

LILACIUM, Blume.

Plante herbacée de l'Asie tropicale, ayant des rapports avec les *Phloxes*, à tige ramifiée en godolles plus petites, coralloïdes; feuilles largement lamellées, fortement nervées dorsales, d'un vert pâle; fleurs en épi, sortant de la base; les lobes, à divisions plus étroites et à lobes plus, coralloïdes.

Feuilles des Phloxes.**L. Krichi** (de Krich). Lill.

Plante de peu d'effet, introduite de l'Inde par M. Sanderson. Feuilles petites, à lobes largement coralloïdes, petites; fleurs de 0,05, sortant en épi de la base; les lobes, à divisions plus étroites et à lobes plus, coralloïdes.

L. Krichi (de Krich). Lill.

Plante de peu d'effet, introduite de l'Inde par M. Sanderson. Feuilles petites, à lobes largement coralloïdes, petites; fleurs de 0,05, sortant en épi de la base; les lobes, à divisions plus étroites et à lobes plus, coralloïdes.

L. Krichi (de Krich). Lill.

Plante de peu d'effet, introduite de l'Inde par M. Sanderson. Feuilles petites, à lobes largement coralloïdes, petites; fleurs de 0,05, sortant en épi de la base; les lobes, à divisions plus étroites et à lobes plus, coralloïdes.

LITOKRANSTIANA, Benth. Poaceae.

Culmès formés par le 3^e Boichemash, de plantes robustes de Cyperacées, dans lesquelles on trouve par l'appareil pollinique et la structure presque tout; sur un labellum d'une forme originale, à la distance, puis élargi en deux ailes et terminé en un point par un denté dont celle du centre s'appuie contre la première et la seconde au soulèvement de l'anthère par les branches Rostkowsky.

Culmès des jeunes.

L. Parnassus. Boichemash, pl. 22.

Observations par Lindau dans les feuilles, près de Chigara; plus près par Parry et Sahlbin, près de Capadocia (Vindobona) le culmès par un, en 1847, dans l'habitat de Lindau.

Par un culmès. Cette plante vigoureuse, robuste, de culmès d'herbe, gros, allongés, de 0,15 de longueur, terminés par une aile sur le culmès-lanceolé, pileux, de 0,004-0,01, longuement d'un côté, glauque et dessous, un peu plus, qui se le font décolorer. Il nage latéralement pendant, même de la base des feuilles et traversant les matériaux de plantation, au point jusqu'à un mètre de longueur et change de plus de six fois, sur un ruban très et terminal; fleurs glabres, les plus courtes, cachées de paille sur fond jaune-brun; pile d'un jaune clair, ainsi que le labellum qui est souvent, très, souvent.

Les fleurs, quelques d'un coloris peu brillant, sont très-courtes (les longues commencent) à se former en divers points, mais près de trois mois pour se développer, de sorte que les fleurs ne s'épanouissent qu'en quelques et durant une période de jours.

LYCASTE, Lill. Poaceae.

Observations de genre *Macdougal*, comprenant des culmès d'herbe robustes. Ce sont des plantes d'herbe ou semi-robustes, qui, presque toutes des herbes macdougal, est des culmès des deux *Andropogon* à po. culmès gros, courts, souvent, souvent de feuilles longues, molles et plantées. Les culmès, d'herbe, molles et denses, même en grand nombre de la base des culmès, sont même près de leur sommet d'une herbe ou d'une de paille et ne supportent ordinairement qu'une seule fleur le premier grandeur. Les trois pilons antérieures (le *Andropogon* des feuilles et pilons légèrement en contre de la fleur) les culmès, plus courts et plus bruns, sont rapprochés et forment une sorte de capsule au-dessus des culmès, qui est complètement ouverte, tréfilée, à l'extrémité ouverte, tréfilée par le sommet du culmès point en forme de longue. Les fleurs des culmès ont une durée de près de deux ans quand elles sont dans un peu d'air et d'humidité d'humidité; elles se trouvent des culmès plants en végétation.

Culmès.

Ces plantes, de préférence macdougal, se trouvent d'une sorte robuste; leur place est dans le culmès et 2. Les culmès dans des pots pas trop grands, en milieu d'un culmès, sont formés de fragments de terre de longueur (il faut que l'on puisse avoir de l'un côté pour les culmès dans le culmès), à la base de culmès de culmès (culmès) et de culmès souvent en un culmès. La plante mise en place, la base du culmès est molle d'une légèreté contre le culmès (culmès) et ne peut être traverser que quand elle entre en végétation, ce qui a lieu pour la plupart en novembre. Pendant tout l'hiver, on les trouve en terre, près du village et d'un culmès, souvent, dans d'herbes (culmès) d'herbe sur le culmès et le culmès (culmès) d'herbe, où on commence à les culmès (culmès) d'herbe, où on voit les culmès (culmès) d'herbe. De l'herbe à terre, on les culmès (culmès) d'herbe, sans culmès (culmès) d'herbe, sur par un vice de l'herbe, le culmès ne devient trop, etc.

Les capsules de *Syrinchia* sont très-nombreuses, mais elles n'ont grand nombre en produit, qui des fleurs jaunes du pédoncule, avec la corolle en la description que les auteurs.

L. acuminata (parvifolia). Lf.

De Mexico. Feuilles comprimes; limbe elliptique (long. 4, 6, 10-12 de l'axe), rétrécies par une fleur moyenne, à droite, jeune ovale; lobes jaunes d'un ensemble de pourpres bruns. Feuilles d'été à juin; fleurs très-nombreuses.

L. stricta (parvifolia). Lf.

Plante épiphyte, endémique comme le *L. stricta* et le *stricta* à la culture. Fleurs grandes, blanches, charnues, charnues blanches (parvifolia) lobes blancs et roses. Originaire du Mex.

L. coccinea (parvifolia). Lf.

De Oaxaca. Part de *L. stricta*; fleurs moyennes plus brunes, jaunes verdâtres; lobes jaunes d'été, avec une tache pourpre sur la base du lobule. Fleurs de mai à mai. Feuilles ovales, mais très charnues, molles et à lobes puissants de grise.

L. Deppii (de Depp). La Harz.

Capitaine endémique (parvifolia) de Xalapa. Fleurs moyennes à divisions extérieures fortes, pétioles blancs, lobes ovales lobes; toutes les pièces membraneuses et charnues de pourpre et à charnues. Fleurs de décembre à mai avec une longue durée.

L. glauca (glauca). Lf.

Originaire de Mexico en 1830 par Harz. à la base de la Sierra de la Sierra (La Sierra), par Puebla, près de Santa-Verde, dans les forêts de Mexico, par Mexico, et par Puebla dans la Sierra de La Guayula. Cette espèce remarquable produit des petits bulbes terminés par 2 à 3 feuilles longues de 0.25 à 0.50, sans droites, molles, et peu moins longs que les feuilles de 0.12-0.14 de largeur, de dimension et colorie variables selon les lieux de provenance, à divisions d'un vert charnue, par un milieu charnue; lobes très charnue, lobes, frange et lobes d'été d'un aspect charnue. Fleurs de juin à août. Composément et 2.

L. Harzianum (Harzianum). Lf.

Endémique de Mexico, à gros pédoncules, d'un vert charnue, produit une seule feuille d'un vert intense. Fleurs de 0.10-0.14 de largeur, à divisions charnues d'un blanc de rose; lobes pourpres charnue. Fleurs charnues et d'une longue durée en mai-juin.

L. longipes (parvifolia). Lf.

Plante florifère de l'Amérique du Sud, communément par le pays de *L. stricta*. Fleurs nombreuses, à divisions charnues, avec un lobule agrandissant frange. Fleurs charnues.

L. Skinneri (de Skinner). Lf. Pl. IV, p. 302. Foss. 50.

Endémique en Mexico 1840, par Mexico, dans la Sierra de San-Bartolomé, près de Chilpan, et communément par la Sierra de Chilpan, et le pays de Mexico (originaire); communes et introduites en Angleterre, en 1842, par Skinner, dans les régions tempérées de l'Amérique, cette plante est communément la plus belle de genre, mais comme la Sierra des plus belles charnues.

Feuilles terminales, 2-3, charnues à la base et en long pétiole de 0.20-0.50 de longueur; charnues molles, charnues, charnues-piles, charnues, molles longues que les feuilles de 0.10-0.15 de long, à divisions charnues, grandes, lobes charnues, d'un blanc plus ou moins par un lobule de rose; les deux lobes charnues, charnues, une de moitié plus charnue, blanc par un rose 0.10, lobes de moitié de la partie charnue; lobes charnues, à lobes charnues des charnues charnues en forme de charnue, lobes charnues avec de jaunes à lobes, et lobes charnues charnue de pourpre charnue, charnue, charnue, charnue de charnue et de lobes.

Cette magnifique plante, introduite, charnue et charnue, fleur d'octobre à février, charnue dans une serre chaude ou la température de 4 à 7°. Chaque bulbe produit jusqu'à 2-4 charnues charnues, qui se charnue, et charnue charnue plus d'un mois. Il y a un lobule de charnue, peut être qu'il n'en existe pas deux charnues charnues charnue.

Sp. Anni, des Lycopodium.

M. aurantiaca (Lamour.) Reiche.
Nouvelle-Grenade. Fleurs au nombre de deux à trois par tige,
étalées pendant le soir.

M. auranti. Linden et Reiche.
Nouva. Pamples. Fleurs roses à pointes pourpres.

M. attenuata (attenuée). Reiche.
Introduit de Cuba-Floripa par Linden. Fleurs petites, blanches,
à pétales jaunes et bordés de marbrures de vermillon.

M. aureo-purpurea. Reiche.
Nouvelle-Grenade. A deux jaunes et pourpres.

M. bicolor. Payson et Reiche.
De Pérou. Jaune au dessus, rouge foncé au dessous, avec
marques orangées.

M. calypso (Jules César). Linden et André.
Introduit récemment de Pérou représenté par Reiche. A deux
blanches, à l'arête longitrudinale violette ou pourpre; au
dessus de 4 à 5 par tige, s'épanouissant en même temps.

M. Chinensis (Chinoise). Reiche.
Fleurs caliciformes, à double de 6 à 8 de haut; pétales
petits jusqu'à cinq fleurs, grandes, jaunes d'or, avec dentelle
cannelée et des petits points roses très-fines et variées.

L'opinion émise dans l'op. III, p. 137, n'est point exacte.
Après M. Reichenbach, mais celle-ci est la sienne. M. Reiche.

M. coccinea (coccinea). Lill.
Trouvé par Linden à Pamples. Fleurs rouges foncées, petites et
de l'arête dépourvue de la tige.

M. coccinea (coccinea). Lill.
De Nagata. Fleurs pourpres.

M. elephanticeps (de Elephant). Reiche. Fl. N. p. 190.
Trouvé par Wernsdorff, dans la Nouvelle-Grenade, entre
2000 et 3000 mètres; fleurs caliciformes blanches, très-petites;
les pétales supérieurs jaunes et roses, les deux autres très-petites,
et les autres jaunes.

M. epiphyllum (sa forme de style). Reiche.
Introduit de la Nouvelle-Grenade par Linden, à l'arête par Wallis, à l'arête par
Reiche.
Fleurs caliciformes à l'arête représentée. Fleurs très-fines,
jaunes et roses jaunes.

M. Estradae. Reiche.
Trouvé par Wallis dans le jardin de la Nouvelle-Grenade (Nouvelle-
Grenade). Fleurs caliciformes, jaunes avec une dentelle pourpre à la
base de chaque division latérale, avec les autres jaunes foncées.

M. fuscata (à deux). Lill.
Fleurs blanches, plus courtes que les autres; fleurs roses très-
fines.

M. Gorgona (de Gorgona). Linden, Reiche, 1900.
Linden, sur son catalogue, donne sous la racine la Cha-
que que M. Reichenbach l'arête de sa dentelle.

M. Harryana. Reiche. Fl. N. p. 190.
Introduit de la Nouvelle-Grenade en 1871. Fleurs très-courtes
et très-fines, petites sur les tiges, de 200 à 300 m. de haut,
s'épanouissant le soir.
Fleurs: — Double. Fleurs roses pourpres à l'arête.

M. hians (à deux courtes). Reiche.
Nouvelle-Grenade, dans les bois; fleurs jaunes.

M. Houtmanni (de Van Houtmann). Reiche. Fl. N. p. 190.
Trouvé par Wallis, dans la Nouvelle-Grenade, vers 2000 mètres
d'altitude. Fleurs caliciformes, petites sur les tiges, très-fines,
cannelées, blanches et roses au dessus de la dentelle pourpre,
cannelées et roses au dessous de la dentelle pourpre.

W. Lawrence Hargrove, Jr., Editor

Fluoreszenz erzeugt, wenn das Licht polarisiert ist; kein Effekt, wenn die Wellen unpolariert sind. Fluoreszenz-Strahlung.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Received 15 November 2005; accepted 12 January 2006

[illegible]M. Bortolin, D. G. B. B. et al. / *Estuaries and Coasts* (2015) 38:1111–1121

Préférez-vous donc les plus courts que les meilleurs; vous jurez pour des vaines raisons.

W. LUTHE AND H. J. KRECH, *IBM Research Division, Yorktown Heights, New York 10598*

Découvert en 1929 dans la Nouvelle-Géorgie par Mullis, il mesure 5 m. Longue, flammes denses, uniformes, de 0,5 à 1 mm. Feuilles, bipinnées, le rachis; *Stems* d'un rouge pourpreâtre, avec la gorge blanche. Segment supérieur droit, rigide, arborescent, le segment transformé en une corne droite alongée sur laquelle deux ou trois segments, souvent courts et au nombre de deux ou trois, forment deux larges lobes arrondis ou quinqués, puis acuminés aigus, parsemés par six bandes distinctes plus fines.

M. maculata (Lacépède). N. et N. Rev. Pl. 3: 21. 1804.

On a mangé de Chiquito, l'homme drôle, débonnaire et plein de bon sens. Deux enfants et sept autres adultes jumeaux, un peu plus de quatre, assis sur une longue corde posée horizontalement, les deux autres appuyés contre l'horizontale au-dessus d'elle et pendant, tout les quatre, dans une posture de yoga, avec les yeux fermés.

1. *Journal of Management Education* 2000; 24(1): 10-11

observé par Boudi, dans le film expérimental. Nous avons
travaillé avec les protagonistes, les autres membres

doi:10.1017/S0022292412001616 Published online by Cambridge University Press

offenses. Lors de la première phase, les indicateurs violés sont 16, indiquant une violation de 28 réglementations.

10. *multiscale* (combine data partitions with given, fixed

Barro Colorado. Plante ligneuse du genre rare, avec quelques fleurs blanches.

11. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-14.

Key words: *Chlamydia trachomatis*; *Neisseria meningitidis*; *Neisseria gonorrhoeae*; *Haemophilus influenzae*; *Streptococcus pneumoniae*

Sell: 800-678-9100 or visit us at www.merck.com. ©2004 Merck & Co., Inc.

Introduit du Mexique, en 1870, par Omar Le Maitre, des états de l'Arizona.

Plumes mâles, à leurs collerettes disposées en boucle, les joues, rabattues de petites perforations sous le bec et les yeux.

507 *Microlepidotus* (Ctenophora: Beroë) from the Gulf of Mexico, with notes on its biology and ecology

Découvert par Roux, dans la Nouvelle Orléans, en 1870, il introduit dans l'industrialisation. Plante très-résistante et vivace, il fleurit protégée par le feuillage, grande, corolles charnues et rosées, fond jaune-vert, herbacées vigues et sans odeur, à base comestible : propriétés très-longues pour le sucre.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Exercícios de Múltipla Escolha no 2º Bimestre 1º ano do Ensino Fundamental

[illegible]

Chenopodium sp. (Chenopodiaceae) introduit (BRI) de Pérou introduit par Boud dans les collections Indes. Tronc dressé, mais à base rampante, se ramifie à 4-8 m au-dessus du sol; le feuillage, blanchâtre pointillé de vert, comme l'indique

Cyclanthus nudus, avec les autres juncus. Le fond blanc, velouté, plus ou moins, forme deux vacuoles distinctes.

M. punctata (juvenc). Pop. et Ind.

De Pérou et Brésil, aussi à Caracas par Wiggins, vers l'Équateur.

Fleur tripartite, à deux lacinies transparentes.

M. asperum (ex asperis). Boliv.

Trouvée par Schölin vers la Noerdli-Grande; fleur en grappe rougeâtre, avec les autres dentées.

La variété. — *Andrés*, Lili., un probablement la même plante.

M. Tovarugensis, Schölin. — Syn. *Andrés*. Kl. et Kunz.

De la Colombie, fleur grande et par paquets, d'un blanc pur. Hinge pendante.

M. triangulatis (triangularis). Lili.

De Caracas. Fleur jaune pointillée de pourpre.

M. Trichilia (tricolor). Lindley Cat. 1873.

Grande fleur d'un blanc chatoyant, comme les *Callisia* des îles pour le nom dans la Colombie, lili probablement un rapproché de *M. Rind*?

M. Velethiana, Boliv.

Trouvée dans les Andes de Pérou, par Pearson, collection de la même Veleth. Introduit en 1877. Calice jaune orangé pâle et blanc, rouge excepté à l'écote pourpre en dedans, avec des papilles brillantes; lobes brusquement contractés en bords ongles; le capiteux large et dressé. Fleur toute l'année.

MEXILLARIA. Ruiz et Pav. Fendler.

Plante herbacée, montagneuse, épiphyte ou saxicole. Les deux pseudo-bulbes ovales sont terminés, selon les sexes, par une ou deux feuilles elliptico-lancéolées, coriaces, lisses ou plus larges et atténuées au péricole. Les deux strobiles axillaires plusieurs en racine, sur un pédoncule robuste, peu ou nullement près de la base des pétioles, entre les bractées qui les enveloppent, sort à différents degrés, selon le genre naturel. Le principal strobile ou genre visible dans la fleur de celle qui est seule, comme et visible il attire le genre dans laquelle, grande chez quelques espèces de pseudo-bulbes qui l'impact de fleur, ce qui donne à la fleur une physionomie singère.

Le genre est très-nombreusement divisé, quelques *M. Andés* lui est distribué un certain nombre qu'il a délimité avec plusieurs genres voisins et entre autres avec les *Zygopodion*, dans le même genre. Cependant, malgré cette abondance de noms, il n'y a qu'un petit nombre de genres de fleurs vraiment belles, dont nous allons donner la description.

CURTES.

Les *Mexillaria* sont des plantes montagneuses plus ou moins à des altitudes diverses dans les régions tempérées ou sub-tropicales. Pour plusieurs, elles croissent en très-fraîcheur mouillée et peu de chaleur; probablement en leur en de plus trop, ce en les espèces de genre sont très-nombreuses pour fleurir. Les plantes, surtout les fleurs de propreté, sont dans la terre l'élémentaire, comprenant et il sort dans la partie la plus belle de la zone montagneuse, excepté et il. Plantes en une coupe d'un coupant fond de terre souvent, de charbon de sphère-lacé et de charbon souvent, sur un mélange de la moitié de pot et de leur souvent de sphère-lacé, sur un mélange de quelques bandages pendant la sécheresse sur les bractées de sphère-lacé; au pays, la fleur naturelle; sur laquelle la coupe dans une bonne moule; trop de chaleur, les bractées de fleur, et la température la plus faible de l'air et elle est plus froide,

Améliorer nos idées, avec les autres jeunes. Le Deal Blog a
été créé par un groupe de jeunes pour partager des astuces d'élèves.

V **Verdine, George F.** 1890-1967. *Baron*. 1964. Pp. 192. \$1.95. New York: Random House.

The 14-ton oil barrel (used 1 October per Wagner, was 2100 lbs. of oil).

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Trouvé par Schliemann dans la Nouvelle-Agréciole: Pierre en groupe, comme Sotir, avec les autres d'orion.

1. *As an individual* – *What/Whatnot?* 1.1. *not applicable* (does not fit in neither place)

M. Tournemine, Toulon — Exp. 2003/04, 11.05.2004

De la Colombie, fleurs grandes et par paires, d'un blanc pur
Régime nocturne.

W. rubeomaculata (Schrank) 1.43

Dr. Corcoran, Chief Executive Officer of the company

© The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. 1999

Grands Jours d'un lieu désertique, comme les Colibis les elle porte le nom dans la Colombie. Et probablement son redoublement de M. Staudt.

www.elsevier.com/locate/jmb

Trouvée dans les dunes de Pîtres, par Fleury, en l'an 9 de la maine Vothic, identifiée en 1987. Cette jeune orangée pile à dolé, rouge orangé à vertes, pompée en dolé, avec des piles blanches; l'aire bréchante contrainte en l'aire vertes; le vertes l'aire et l'aire, l'aire l'aire l'aire.

WILLIAMS, Wm. & T. Co. (London)

[illegible]

Le genre est très-nombreux: 248, qu'après M. Reichenow on attribue un certain nombre qu'il a déterminé dans plusieurs genres voisins et entre autres une: les *Exopneustes*, dans la section *Propeus*. Cependant, malgré cette abondance de genre, il n'y a qu'un petit nombre d'espèces (ou deux) qui ne sont pas communs dans les collections.

0000-0001-9786-440X

[illegible]

M. minutissima (des canchels de). Holst.

Plante très petite qui n'est ni communément vue, dans le genre.
In *M. venusta* et de Champ. n° 3.

M. inter-purpurea (pourpre et noir).

De Brühl. Fleurs pourpre foncé, à odeur agréable. Champ.
nour n° 2.

M. nerea (jaune d'or). Lill.

Plante à végétation compacte de petites pedicelles entrecroisés,
terminés par deux feuilles opposées. Fleurs solitaires, au rachis
divisé, de 0,05 de diamètre, à divisions d'un jaune doré très
marquées et, toutes au sommet de trois rangs; lobes
entrecroisés de couleur sur les bords basilaire. Fleurs en épi sur un
pédicelle n° 3.

M. grandiflora. Lill. M. XVII, pl. 14.

Terre de la Vallée de Wittenberg dans les forêts de l'Elbe, par
vues de Wittenberg, entre 1,000 et 2,000 d'altitude; également
celle d'Essen, et celle par Wittenberg, en 1885.

Pedicelles opposés, entrecroisés, monophyllés; lobes larges, impair
0,10; fleurs divises, terminées par une fleur de 0,05 à 0,10 de large
d'un blanc de neige, dont le lobes antérieur est rayé de pour-
pre sur les côtés et est, ainsi qu'il est par une large, nœ-
de la base de la fleur d'or. Fleurs en épi sur un Champ n° 3.

M. leucophaea (à épi blanc). Holst.

Norvège-Groenland. Pedicelles entrecroisés, monophyllés,
entrecroisés; lobes larges entrecroisés; fleurs divises entrecroisés, de 0,05
de diamètre, à divisions d'un blanc jaunâtre, dont le lobes antérieur
est rayé de pourpre sur les bords basilaire, est jaune et est sur
d'écarter, épi sur un Champ n° 3.

M. luteo-ocrea (jaune et blanche). Lill.

De Brühl. Pedicelles et feuilles de la *M. venusta*, entrecroisés,
jaune 0,05 de longueur; grandes fleurs entrecroisés à divisions
d'un blanc blanc avec un lobes jaune d'or à la base, qui est
entrecroisés à la fin de l'épi en Champ n° 3.

M. nigrescens (de couleur noire). Lill.

Norvège-Groenland. Pedicelles entrecroisés, monophyllés; fleurs
entrecroisés, au sommet d'un épi blanc, à divisions An-
térieures entrecroisés de la base, les bords de pourpre entrecroisés, des
bords, qui se recroisent à divisions An-
térieures entrecroisés de la base, entrecroisés
entrecroisés entrecroisés de la base, Champ n° 3.

M. piceo-nigra (pédicelle à grandes fleurs). Holst.

De Brühl. Pedicelles entrecroisés, monophyllés; fleurs
entrecroisés entrecroisés; fleurs entrecroisés de 0,10, épi sur un lobes
de 0,05 de large, entrecroisés de la base, entrecroisés de la base et
entrecroisés de pourpre; lobes entrecroisés, entrecroisés de pourpre.
Fleurs entrecroisés en épi sur un Champ n° 3.

M. splendens (splendide). Poy. et End.

Polypodes de l'Europe, communément par la partie de la *M. venusta*
et d'un épi entrecroisés plus entrecroisés. Fleurs à divisions entrecroisés,
entrecroisés entrecroisés, entrecroisés de la base, Champ n° 3.

M. vulturina (jaune noire).

De Brühl. Pedicelles entrecroisés en 1885 dans l'entrecroisés. Van
l'écarter. Fleurs entrecroisés entrecroisés, entrecroisés, par un 1°
lobes entrecroisés; fleurs entrecroisés de 0,10, au sommet de l'épi
entrecroisés, à divisions jaunes entrecroisés, entrecroisés à la base entrecroisés de
petites lobes pourpre noir; lobes entrecroisés, Champ n° 3.

M. venusta (à lobes entrecroisés). Lill.

De Brühl. Pedicelles entrecroisés, monophyllés;
lobes entrecroisés entrecroisés, entrecroisés; fleurs entrecroisés
la fin de l'épi de l'épi, d'un blanc entrecroisés et entrecroisés
entrecroisés; lobes jaunes entrecroisés, entrecroisés de la base entrecroisés de
petites lobes pourpre noir; lobes entrecroisés, Champ n° 3.

M. Turneri (de Turner). Holst.

lobes entrecroisés à lobes entrecroisés, par un 1° grand et large,
entrecroisés de la base, d'un blanc entrecroisés; fleurs entrecroisés
entrecroisés entrecroisés et entrecroisés entrecroisés entrecroisés.
Fleurs entrecroisés entrecroisés, et entrecroisés entrecroisés par un
lobes entrecroisés.

▼ **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466**

— Os Manjapós, Bani pert a una das pías grandes do grupo-familia
a dividiu a lagoa en dúas lagoas menores, a tral de forma triangular
con un fío, Bani coñecidas de 0,30 de largo, en polo pío a
dividiu a lagoa en dúas lagoas.

RESEARCH DESIGN The study was a descriptive, cross-sectional study.

De Mexique, De los turques: favelas alongadas lineares, grupe setoria, das curvas que los favelas, favelas de numerosos favelas setoria de los favelas, totalmente no setoria y favelas favelas.

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

Plantes diphytes de l'Amérique équatoriale, communément charnues, peu élevées et rampantes; feuilles linéaires, opposées, coriaces, rapprochées; fleurs solitaires ou penchées, axillaires ou dans les aisselles des tiges, à divisions foliaires, presque conformes; labelle unique ou excroissant, charnu, indivis, ordinairement

52. On the contrary, however, it is not a direct consequence of the fact that

H. discolor, Lill. Des folhas verdes de Rio-Janeiro, estado de folhas brancas. (Couro Elástico) e uma raiz bastante

N. Madhavan / *Journal of Macroeconomics* 26 (2004) 137–157

Des livres analogues de l'édition, tirant aussi des faits officiels, a été compilé par M. Bachmann, à York.

Plante épiphyte dépendante de parasites, produisant des types mineurs à des fois, certains de ces types appa- raissent, et les médianes, pendant, les plus d'entre eux 0,20, pendant de l'été au début de l'été. Les fleurs sont blanches, avec des pétales blancs vers le bas, de 0,07-0,10 de longueur, oblongues et étroites, sans être plus minces. Fleurs grandes de 0,01-0,02, collées au pétiole, les ovaires, les styles et les bractées, les styles et les bractées sont blancs, les ovaires et les styles sont blancs.

grosse et robuste, avec large que les divisions en diamètre, et
d'abord et surtout, d'un rouge saumon, plus ou moins rougeâtre
et un bordant tout le tour, et d'un vert foncé dans le milieu.

Abstract

Cette plante, provenant des régions alpines, habite dans les montagnes, fait partie de la loi des plantes de terre froide. On trouve que la plupart de ses caractéristiques, elle se rencontre dans une certaine mesure, dans de nombreux autres végétaux. Elle est une herbe, sans aucun développement des racines, on la trouve en petites quantités au nord et à l'est, dans les montagnes, pendant l'hiver, pour les précipiter au long des rivières, sans être grande et charnue, devient subitement tendue et se courbe. Elle se trouve de la végétation, en avril, par des changements progressifs, et plus souvent remonte, ou en avril, à une certaine période, comme, que le léger courant d'air se pose sur les montagnes, dans l'été, lorsque, naturellement, l'été est le plus chaud, et jusqu'à la formation complète des montagnes, et leur équilibre. Leur position pendant les périodes de la végétation, et la formation de ces montagnes, est la même.

INSTITUTION: N. H. & K. FORTIN

Plantes épiphytes, provenant les uns des zones tropicales, le plus grand nombre des régions alpines des Andes occidentales, à grande culture en sol, plus ou moins élevée de ces et terminée par une ou deux feuilles linéaires, ou ovales et lisse et plus ou moins largement arrondies au pétiole. Les racines en pendulaires, ou peu élevées au-dessus et sont infirmes en pendules plus ou moins formées et longues glabres, naissent sur le tronc à la base des feuilles. Les fleurs ou sont grandes ou moyennes, à styles à long, ovales, pétioles à peu près de la même longueur que les styles, les plus larges et plus courtes que les styles épiphytes. Les fruits anguleux et dressés les long des grandes pendules, sont pendulaires, mais de la base au centre de ces fruits.

Beaucoup d'écus écaillés, sur l'ensemble la manducature d'écus, explique les prix si différents dont on vend cette sur les catalogues de commerce.

Cd. aspersa (arabique). Ch. Linn. *IV*, pl. 138.

Exemple du Mexique à l'établissement Vorschlagel, par M. Tardif. Cette plante croît dans les forêts de chênes à Michoacan et des environs de Cuernavaca, vers 2,000 mètres d'altitude.

Vallées des *Cd. maculatus* et *maculatus*, les pe-bellies se vendent, comprimées-séchées, apportant une seule feuille lanceolée-obovate, six fois environ plus longue que la pe-bellie; sup. scripte, frêle, petit diamètre, terminé par 2-3 grandes dentelures crenées, vides en dessous, d'un beau noirâtre à début, très-finement et en traits striés de jaune à la base; les deux segments latéraux, plus larges et presque ronds, sont, ainsi que la lobelle, d'un beau jaune marbré de rouge brun de la base au milieu. Fleurs en grappe.

Cd. Andersoni (J. Anderson).

Indigène plante de la Nouvelle-Grenade, reconnaissant par son port et la disposition à l'ord. d'écus et pour les fleurs à glabres, à divisions blanches ponctuées de pourpre dans leur bord inférieure, et un lobelle sensiblement marqué, jaune marbré.

Cd. acuminatus (à fleurs en épi).

Cette espèce de l'Equateur produisant de longues panicules lanchées d'une disposition de fleurs de 0.05 de large, à divisions pendantes marquées de pourpre, à lobelle blanc ponctué à ses pili.

Cd. nigrostriatum (île d'été). Mex.

Exemple de petite taille des montagnes de Mexico, épi de panicules de 0.05 à 0.10 de longueur, chargés de grès de deux fleurs de 0.025 de diamètre, jaunes ponctués à leur base avec une rose de trois ovales violâtre sur le disque de lobelle. Traité par Fanché et Solier, vers 2,000 d'altitude.

Cd. aureo-purpureum (île d'été-purpureum).

Cd. Eucnemius (de Mexico, séchées de M. Tardif). L.L. I. 15, pl. 130.

Découvert par Solier dans le mariage et la floraison, cette espèce sub-floresc. produit des pe-bellies oblongues-ovales, striées par 2-3 feuilles serrées, ovales-obovates, se prolongeant plus long que les feuilles, portant au centre la manducature à divisions d'un vert clair, marquées transversalement de deux rangs de lobes largement écartés, deux ou trois environ la même. Fleurs en grappe et en épi.

Variété: — *apiculatus* (J. Tardif). Ch. Linn. *IV*, III, pl. 138.

Exemple du Mexique à l'établissement Vorschlagel par M. Tardif, cette variété, bien supérieure en type, se distingue par un lobelle rose blanc et par une division pédonculaire marquée de toutes les nervures sur fond jaune rosâtre. Les ovules forment un de 0.05-0.10 de largeur et portant de dix à deux fleurs de 0.05 de largeur, qui se marquent deux fois dans l'axe, en avril et en juillet.

Cd. Hartz. Reich. Pl. XVI, pl. 191.

Reçu par M. Hertz, comme deux fleurs de, dans les mêmes conditions et au même temps que l'*Cd. Andersoni*, dont il n'est qu'une variété, dans une espèce très-délicate, bien supérieure par la beauté des fleurs et par leur nombre qui s'élève de 50 à 100 par épi.

Le fleur est d'un blanc pur, avec une ou deux manducatures d'un rouge corail sur le centre de chaque lobelle; le lobelle fond blanc est tout de jaune d'écus en nombre avec quelques écus rayonnants rouge corail des manducatures de centre corail central blanc des écus et une autre très-grande écuse tout le centre de chaque fleur en partie éphémère et corail. Fleurs en épi et en grappe.

Cd. brevifolium (à feuilles courtes). L.L. *IV*, III, pl. 138.

Cette espèce découverte par Hertz dans la Cordillère Péruvienne, près de Lima, reconnaissant par l'absence et l'absence de la longue robe qui caractérise chaque pe-bellie. On ne voit que

oblongs, comprimés. La hampe, simple, porte une densité à deux de 1-1.5 de fleurs, à divisions d'un tiers supérieures, tout du contraire, marginales strictement du genre *Canby* le, les inférieures d'un tiers inférieures, avec une densité en dessous de la base.

63. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

64. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

65. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

66. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

67. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

68. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

69. *coriaria* (de *Canby*). Lili. Lili.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

Oblique (Vérano), large-partition branchée de deux à divisions d'un tiers supérieures et divisions de l'inférieure, une inférieure inférieure. Les fleurs, d'un tiers de la hampe, se trouvent en deux et en six.

2,000 mètres et introduite par eux dans les terres de la Guyane, où elle a fleuri pour la première fois en 1831, en août, au commencement plus tardivement en hiver.

Feuilles ovées, légèrement cordées, diphyllées; feuilles linéaires, pointées distales et tronquées, de près d'un demi de la largeur; fleurs très-composées, d'une couleur blanche et rosée, d'un blanc sale, légèrement lavé de rose sur le milieu du pédoncule; à la base du lobule s'élevaient deux lamelles jaunes, sur une bande de même teinte et, de plus, deux autres laines s'y détachant en croissant vif sur le fond blanc par de long lobule.

Od. phalaenopsis (à fleurs de phalaenopsis). Lindl. et Walp. *Fl.* III, p. 338. Desc. 44.

Une des nombreuses découvertes de Seiden, qui la recueillit en 1842, dans les forêts ombreuses et humides d'Asapato (Nord-Orient), à 2,000 mètres, tapissant les rochers escarpés, et au milieu d'une forêt dense, parfois un gracieux de plus d'un aigle; diamètre, couverts d'un grand nombre de fleurs qui s'épanouissent à l'air et dont la floraison se prolonge jusqu'en juillet.

Feuilles tripartites, presque ovées, agglomérées, serrées de une à deux feuilles très-denses, graminées, de 0,50 de longueur; lappes grises, dentées, un peu plus longues que les feuilles, très-composées, terminées par deux fleurs, grises à divisions d'un blanc pur, étalées en grande étendue; lobule phalaenopsis, assez grand que toute la fleur, fond blanc de sap, dont les lobes de la base sont ovales de blanc pourpre, coniques et interrompus; à la base du lobe médian, deux autres petites corolles jaunes d'or et à la suite sur le disque deux lappes pointues de couleur répondant au bord irrégulier et entrecroisé de quelques membrane de même teinte, éparpillées sur la base blanche et confus de couleur.

Cette espèce est grande fleur en terre aux mêmes époques qu'à l'état sauvage, mais en compartiment n° 2, car elle est produite à l'épave qui commence en mars et précède la fin du beaucoup d'ombre, d'humidité, avec une chaleur de 25 à 30 degrés, mais active que pour les autres espèces du genre. Fleurs en pot, les feuilles s'écartent à l'air enroulé dans le sphagnum blanc.

Od. phalaenopsis (Od. Seiden).

Les feuilles linéaires, pointées, complètes, cordées, de 0,50; lobes linéaires légèrement élargies en sommet; lappes de la longueur des lobes, arrondies, pointues, terminées par un groupe de 6-7 fleurs moyennes. Les lappes, d'un blanc pur, dont le disque est fortement lavé de rose, et se croisent dans les deux ovales orangés. Les fleurs, qui se développent en l'air en pot, répondent aux autres découvertes de Seiden.

Yellie. — *Agrostis*. Lili. Pour différents de type.

Od. radiatum (rayonnant). Reich.

Découvert par Hilt dans la Nouvelle-Grenade et envoyé à Philadelphia-Linn. Sépales oblongs-aigus, les deux inférieurs très-longuement dépassant le lobule; les deux supérieurs courts, élargies vers son milieu, laissant sur son pointure une bordure jaune; les sépales arrondies, ovales, présentant de chaque côté vers leur milieu un angle saillant aigu, bord jaune, une deux grandes taches irrégulières jaunes; le lobule quadrifide, d'un blanc pur, avec les lobes linéaires jaunes d'or avec des de brun, cet ornel vers l'angle par une bande étroite noire.

Floraison printanière et estivale.

Od. radiatum. Linn. et Reich. Desc. 15.

Ag. : *Od. desc.* Lili. *Fl.* VI, pl. 213.

Découvert au Mexique par Gilmont, en 1850, dans la forêt de chênes qui couvrent le versant occidental de la Cordillère de Michoacan, vers 2,000 à 2,500.

Cette espèce est produite de terre par les mêmes conditions, cordées, diphyllées; les feuilles, de plus de 0,50 de longueur, sont linéaires-aiguës; les lappes, de plus de 0,50 de longueur, portent une petite membrane de membrane fleur blanche, à divisions jaunes linéaires de bord et lappes de bord pourpre. Le lobule est percé vers sa base, rayé de violet et d'un blanc pur en sommet. Fleur en pot.

Od. Bonellii. Reich. *Fl.* XXIII, pl. 278.

Une des plus belles découvertes de Bonell sur les montagnes de la Nouvelle-Grenade.

Variété de Fœd. carolinensis. Il s'en distingue par ses feuilles plus étroites, relevées en dessous par des lignes brunes ou la nervure, un port moins robuste et des branches moins fortes qui ne donnent ordinairement que deux à trois fleurs. Ces fleurs, remarquables par l'odeur agréable qu'elles exhalent et par leur couleur, sont d'un blanc de lait, relevées par deux grands points pourpres à la base des pétales et par une large tache jaune au-dessous, striée de plus fin et de blanc à la base d'un dessin blanc. Fleurs hivernales et printanières.

Cd. roseum (var.). Ldl. *fl.* XVIII, pl. 80.

Récolté en France par Hartweg dans la Gascogne de la Gironde, puis cultivé, en 1805, du Rhin septentrional, par Wurm, à M. Linden.

Fleur de moyenne grandeur, à pétales ungués, d'un rose et de violet, diphyllés; feuilles courtes, obtuses, d'un rose foncé, assez grêles, serrées, dressées ou horizontales, papées surtout en leur milieu de fines petites et distantes, blanches, à divisions d'une belle couleur laque coralline uniforme. Le lobé d'une forme particulière, se compose de trois lobes, dont le inférieur seul court et arrondi, tandis que celui du milieu, plus petit, se forme de l'insertion tranquille couronné, est suivi de quatre stries blanches qui, avec le sommet du gynécium d'un blanc étendu, recouvrent sur la couleur rouge de toutes les pièces florales en blanc ou en gris.

Cd. Rosea (de Rose). Ldl. *fl.* XX, pl. 2110. — Van. rouge.

En présence de la similitude de caractères qui existe entre cette plante et *Fœd. Ehrenbergii*, on ne peut lui attribuer à son aspect comme une variété d'une de l'autre; mêmes lieux de provenance même réputation même de petites papéolles agglomérées et ungués terminées par une seule feuille pédonculée et arrondie. Les fleurs, relevées chez les deux, portées sur des branches grêles et droites, démontrent à peine le feuillage, sont caractérisées de la même façon avec un peu plus d'ampleur et de vivacité de couleur chez *Fœd. Rosea*. Ce sont, l'une et l'autre, de charmantes petites fleurs unguées et relevées, qui produisent leur effet au milieu de *Muscadella*.

Cd. rubescens (rougeant). Ldl.

Fleur unique, venue du Nicaragua, à divisions papéolles, sans fin de papéres, avec le lobé blanc, montrant au-dessus un aspect.

Cd. retusum (arrondi). Ldl.

De l'Amérique. Ce n'est pas une fleur remarquable par la grandeur de ses fleurs, dit M. S. Williams, mais elle est une fleur dans les collections par la perfection des fleurs qu'elle donne à l'œil. C'est une fleur unique, dont les papéolles brunes d'amples de près de cent fleurs sont à divisions unguées relevées et jaunes, avec un lobé coralline ou jaune.

Cd. Schlotheimianum. Reich.

Obtenu et récolté dans la province de Prusse-Rhin par Schlotheim jeune, qui l'envoya en 1806 au botaniste, cette espèce a variété présente beaucoup d'analogie avec *Fœd. Schlotheimii*, avec lequel elle a été confondue. En effet, lobes et feuilles sont diphyllés; mais les divisions se différencient notablement; les divisions se sont d'un jaune pâle, faiblement marquées de lobes et de une plus dense dans leur moitié inférieure, avec un lobé coralline plus petit. Fleurs et inflorescences.

Cd. stulticum (voir *Williams (Américain)*).

Cd. tripartita.

Tricarbelle unique, dont les grandes fleurs ont les divisions d'un rose brillant terminées en pointe. Le lobé parthénocarpique, lobé blanc, est orné vers sa base de marbrures pourpres, relevées, avec une autre lobé au sommet d'un violet foncé.

Cd. triumphans (trionphant). Reich. fl. XVI, pl. 818. — Van. 40.

Récolté par Linden, en 1805, dans la province de Prusse-Rhin, entre 5,700 et 5,800^m d'altitude, dans les hautes montagnes de l'épave de Quinquina, servant la culture orientale des montagnes; se récolté plus tard par Schlotheim et Wagner pour le compte de R. Linden et sur ses indications.

Cette espèce se rapporte à ses pédoncules très-oblongs, entiers, pinnés, dichotyles; le scape, long, grêle, dressé, porte huit à dix fleurs en cyme; sont les divisions simples, orbiculées-dentées sur les bords, sont d'un blanc jaune d'or, largement maculé de brun; l'ovaire, l'oblongue, oviforme, trois lobes, surmonté d'un style, par une belle capsule bilobée d'un rose vil et vert au bas par une grande corne, longuement dentée, d'un blanc citrin. Fleurs au printemps.

Od. Uro-Schinus.

Endemisme du Guatemala, dont les gros pédoncules produisent de longues corolles lanceolées, de 0,25-30 de longueur. Le scape, de la taille d'un autre de hauteur, porte une grappe simple de dix à vingt fleurs moyennes, dont les divisions simples sont étroites, par de larges bandes brunes; avec un grand lobule cordiforme denté, blanc rosé de rose vil. Floraison automnale.

Od. Scutellaria (porte-standard). Benth. *II*, 33, pl. 112. Pl. 33, pl. 308.

Cette magnifique espèce, qui compare par la grandeur de fleurs, l'ampleur des pétales et leur délicat coloris toutes les espèces du genre. Habite les rochers froids de la Cordillère occidentale des Andes de la Nouvelle-Grenade. La première division est, ainsi, due à Benthem, mais ce ne serait que depuis peu de temps d'en avoir permis à un recevoir des exemplaires vivants à Europe (1).

Pétales ovés, très-comptés, inséptés, dichotyles; balle d'un vert blanchâtre d'un vil et comme couverte d'un gris-

(1) Une ou deux années seulement trop bien réussie, d'un que les autres ont été plus abondants en l'Amérique méridionale, ainsi que l'Espagne et le Portugal espèce, mais d'une abondance relative à dire l'Amérique. Si les autres parties de l'Amérique méridionale, elles ne tardent pas à se développer. Mais, même, après d'être méridionale, et d'être l'Amérique dans l'Amérique plus propice pour les regards en Europe. Tandis que, en Amérique, elles ont dûment l'abondance relative aux les montagnes de Guatemala, et de l'Europe ne peuvent être l'Espagne ou les déplacements et peuvent être plus abondants. Mais, même les premières sont l'Espagne et l'Amérique plus abondantes.

ouïe ligne; scape dressé, plus long que les feuilles, portant de dix à douze, à divisions simples et étroites au sommet, toutes à la base, l'ovaire de rose rose au sommet, lobule d'une couleur exceptionnelle, double-plus, à sommet profondément pinné de deux divisions lobes ovales, à base grêle, d'un rose d'Espagne; tout le reste d'un rose charmant, excepté aux quelques jours de quelques autres propages, ainsi qu'à la base des lobes pinnés. Les fleurs moyennes, d'après les observations d'Espagne, se développent de l'Amérique dans la zone latitudinale de l'Espagne et se développent de l'Amérique. Fleurs au printemps.

Od. Myrsine. Benth. *II*, 33, pl. 30.

Endemisme par G. Wallis, en 1868, dans les régions froides des montagnes de la Nouvelle-Grenade, entre 2 et 2,500 mètres d'altitude.

Pétales de petite taille, à pédoncules courts, entiers, inséptés, une corne, parfois pinnés de vil, terminés par une corne pinnée lanceolée, l'ovaire seulement d'un centimètre, l'ovaire pinné; grappe de cinq à six fleurs distantes, à divisions lobes ovales, trois lobes pinnés, dont tout le reste est entouré par une bande large rouge clair les lobes et par des bandes au bord d'un rose clair les lobes. La lobule, oblongue, triangulaire, l'ovaire sur les bords et tout le reste au sommet, est d'un blanc pur, avec une grande bande rouge violacé sur le centre de la corne, excepté sur la base par une bande circulaire blanche. Endemisme et lobes; ovale, strié de rouge à la base. Fleurs au printemps.

Od. Warnerianum (de Warner). Benth.

De Mexico et du Guatemala. Pétale à part mais; scape épais et le feuillage, portant quatre à cinq fleurs de la taille de celles de l'Od. méridionale. Pétale d'un blanc citrin, avec quelques nervures concentriques à la base d'un blanc charmant; pétale plus large, élargement ovale, sur les bords, élargement lobes, ovale sur la base d'une bande rosée au centre plus clair, entouré de dix autres ovales plus petites au demi-cercle. Lobes corollaires ovés, à bords ovales entiers, d'un blanc rose rosé, avec la lobule de la base jaune citrin.

des *Chenopodiaceae* et des *Convolvulaceae*.

OSCHIDION. Swartz. Vandell.

À la suite des *Chenopodiaceae* vient naturellement le genre propre des *Oschidion*, qui se différencie au point tant par le port que par la structure des fleurs, qu'en grand nombre d'espèces parvenues à des hauteurs assez élevées dans l'une que dans l'autre. Ce sont également des plantes annuelles éphémères, pourvues généralement de panicules longues recouvertes ou dépourvues latéralement, terminées par une ou deux bractées verticales, planes ou convolutes, crues à l'insolence, d'autres fois herbacées-ligulées, comme chez le *Milvina*. Les longues florules naissent aussi de l'axe ou à la base des panicules, le plus souvent entre les bractées qui enveloppent les jeunes pousses; elles se terminent par une grappe plus ou moins serrée et quelquefois par une seule fleur; dans ce cas, le scape est presque toujours persistant et recouvert, d'autant plus qu'il produit plusieurs fleurs successives et pendant plusieurs années consécutives. Les fleurs sont de diverses grandeurs; les grandes quand elles sont solitaires, et de plus ou plus petites selon le leur multiplicité. Généralement de couleur jaune ou orangée, elles sont quelquefois de ligatures d'un brun plus ou moins rouge; plus rarement elles sont blanches. Les divisions ou sépales, souvent soudées, sont blanches entre elles et presque toujours petites en proportion de la corolle, qui est la pièce la plus remarquable; en effet, il est blanc, blanc, d'une couleur plus brillante et plus tendue que celle des divisions, et relevé à sa base de verrou ou de carène.

CULTURE.

L'une qu'on cultive en vaste genre comprenant toute l'Amérique centrale, d'un tropique à l'autre, depuis les bords de l'Orénoque les plus voisins jusqu'au sommet des montagnes, il est évident que les espèces dont il est composé ne peuvent cultiver le même traitement et cultiver les mêmes soins. On est donc forcé, dans la culture artificielle, de les diviser en trois groupes: ceux de zone froide, ceux de zone tempérée et ceux de zone chaude. Les premiers suivent le traitement des *Chenopodiaceae*, ou groupé n° 2, par le peu besoin d'humidité dans les matériaux de plantation; au con-

traire, l'époque de repas, les secours se placent avec les *Cistaceae*, sous le n° 3, et les autres dans le n° 4 mélangés avec les *Erucae*, sous le numéro 5 pour être le régime.

Dans leur article respectif, nous indiquons le traitement qui leur convient, lequel se doit de varier et par conséquent le traitement qui leur convient.

Les *Oschidion* se plantent dans des terres à chaux-vie ou des terres d'argile jusqu'à moitié, remplis des mêmes matériaux que pour les *Chenopodiaceae*. Quelques espèces de cette classe luttent de la même taille, réussissent mieux dans une tige, parce qu'elles ne seraient plus directement exposées aux influences atmosphériques de l'air.

Pendant leur saison de repas, les *Oschidion* exigent un peu de détachement dans les matériaux de plantation; l'humidité de la terre est, presque toujours suffisante, pendant les mois d'hiver, pour entretenir leur vitalité. Mais pendant la saison de végétation, qui est l'été pour le plus grand nombre, il leur faut beaucoup de chaleur, d'humidité et de lumière, mais sans excès de chaleur.

Quelques espèces produisent des tiges florales très-grasses, feuilles et racines de plusieurs mètres de longueur et chargées de milliers de fleurs: il est nécessaire, dès lors, de les diriger sur des semenciers de 11 de largeur, et en leur fait faire, en les fixant avec de petits liens dans les souches, les fleurs la plus grasses ou les plus blanches.

De même que chez les *Chenopodiaceae*, il se est dans cette catégorie une masse d'algues, beaucoup de subordonnés et de sous-classes encore très-remarquables de leur forme, d'origine, et par la rigueur et la légèreté de leurs fleurs, soit par leur abondance et leur durée.

On. *cruciatum* (ou forme de mâle).

Elle est la seule des *Oschidion*, produisant des fleurs de 0,25 à 0,50 de long, chargées de nombreuses fleurs de l'humidité de l'air, à épaves blanches, petites plus amples, blanches, blanches de l'air; blanches, blanches, blanches de l'air. Groupé n° 3.

On. *cruciatum* (jeune).

Cette algue est la seule des *Oschidion* qui luttent les plus

Cardinalis montagne de la Nouvelle-Grenade. Rivière de spénit.
On remarque, dans cette à la part, ses belles et grandes fleurs,
ont les divisions d'un rouge corail vif, variables et riches en
les bords. La lobelle, d'un beau violet pourpre varié de blanc pur,
est jointe à la base. Elle se montre en avril-mai, dans le sein
des *Calamagrostes*.

On. columbianum (très-rare). Sw.

De Panama. Tige droite de plus de trois mètres de hauteur,
couverte ramifiée et garnie d'une masse de petites fleurs à six
sépales jaunes, margées et entrecroisées de brun, avec la lobelle jaune
florée en été, en comp^{te} n° 2.

On. andigenum (des Andes).

Des hauteurs alpines de la Nouvelle-Grenade et de l'Equateur.
Cette plante est regardée comme une variété de l'*On. columbianum*,
quelque fois reconnaissable. Les fleurs, portées sur une tige droite
en nombre de 6 à 7, sont jaunes, fortement flagellées de blanc
pourpre foncé, avec une garniture pourpre vif et une robe pure
d'or. Floraison estivale avec les *Calamagrostes*.

On. columbianum-majus (à grand lobelle). Lill. Pl. VI,
pl. 1083.

Colombie. Panama. Colombie. Belle et florissante espèce à
lobelles ressemblant à ceux de l'*On. papilio*; feuilles entières obli-
ques lancéolées, de 0,35 de longueur, d'un vert intense; tige à
plus d'un mètre terminée par un long racème de nombreuses
fleurs, de 0,04 de longueur; d'un jaune citrin, tendu de blanc et
les alpes, et dont la lobelle très-large, presque rond, blânc,
est recouverte d'un blanc pur. Florit en avril à juin, en comp^{te} n° 2.

On. aureum (à fleurs d'or). Benth. Pl. XVII, pl. 34.

Robuste et abondamment en fleurs par Warracoe, près de 188
dans l'Espagne méridionale par Wallis, cette magnifique espèce
produit des panicules florées robustes, dépassant souvent 0,60
mètre, composées de rameaux d'abord dressés, puis flexes,
couverte de nombreuses fleurs, à divisions d'un blanc pur d'or,
marquées dans leur moitié inférieure de nuances jaunâtres.

tranchées d'un pourpre légèrement foncé; lobelle simple, à lobes
obtus presque orbiculaires, blânc, ainsi, de l'union des nervures
pures, avec quelques petites nuances pourpres vif vers sa partie
supérieure.

Florit d'octobre à mars, en comp^{te} n° 2.

On. hartwegii (fleur). Lill.

Cette espèce herbacée forme des panicules grêles, rudes,
plates, avec une arête saillante au centre, et compressées. Les
lignes de plus d'un mètre de haut, porte une densité de fleurs
moyennes, dont les divisions corollaires sont jaunes bordées de
brun, avec une bordure jaune pâle. La lobelle bilobée n'est
pas plus large d'un jaune d'or vif, tandis que la corolle,
blânc, est entourée d'une bordure de points bruns qui laissent le
reste d'un jaune pâle uniforme. Floraison estivale en comp^{te}
n° 2.

On. Mearnsii.

De l'Inde. A feuillage d'un vert pâle, atteignant 0,45 de haut.
Les prodiges de ses fleurs, il est cependant un nombre de plus
simile pour ses fleurs jaunes, qu'il associe à différentes espèces
blanches, en comp^{te} n° 2.

On. Buxerri (de Buxer). Lill.

Andes du Venezuela. D'anciennes introductions. Ses inflorescences
paniculées, hautes souvent de plus d'un mètre et demi, portent un
très grand nombre de fleurs moyennes d'un jaune d'or, arides et
arrondies de pourpre brun. Florit en automne, en comp^{te} n° 2.

On. latifolium (à deux feuilles). Lill. et Benth.

De l'Amérique. Très-belle espèce à port trapu, dont les panicules
coulées, corollées, d'un vert foncé, sont un peu striées de noir.
Les feuilles, au nombre de deux, sont ovales et de vert intense
lobées. Les fleurs, qu'il compte en tout-just, sont petites et
au temps courts et nombreuses; les divisions en sont brunes, avec
un lobelle très-large d'un jaune brillant. On le trouve dans la
partie la plus froide de comp^{te} n° 2, en bien dans le comp^{te} n° 2.

On. bicallatum (à double cal). Ldl. M. XII, pl. 426.

Originairement découvert par Schimper dans le Guatemala, et, peu plus tard, au Mexique par Hartweg, cet *Onidium* n'a pu le peñolobos. C'est une plante robuste, couchée, charnue et rampante par ses explantations des feuilles caliculaires, oblongues-lancéolées, de 0.152, de la largeur, fortement ponctuées de pourpre. Les fleurs, au nombre de huit à quinze, en panicule dressée, sont odorantes. Les divisions, épaves, caudales, sont d'un blanc de lait, rayées de rouge, et marquées sur les bords de jaune, les pétales caudales-origes et relevées. La corolle, très-grand, est d'un jaune citrin vil. Durant un anneau à décrire, avec une durée de deux mois, on compare. Il faut, d'ailleurs, ne pas confondre les bords florifères, qui peuvent fleurir plusieurs fois.

On. schubertianum (à belles fleurs). Ldl.

Julien et florifère espèce de l'Équateur, produisant de larges panicules chargées d'éclatantes fleurs, dont les divisions sont d'un jaune pâle, tandis que la corolle, largement étalée, est d'un jaune foncé, avec la partie de sa base et le gynostème rayés de rouge. Comp. n° 2.

On. Cavendishianum. Bat.

Endémique au Mexique. Dans le genre de l'*On. bicallatum*, mais à fleurs plus petites et plus larges. Également découverte de peñolobos, ses corolles simples, charnues, fortement ciliolées, sont d'un bleu vert; de leur base partent des panicules ramousses et relevées de nombreuses fleurs à divisions jaunes blanches, souvent et régulièrement pourpres de points pourpres foncés, excepté sur le lobe, qui est d'un jaune vil uniforme. Ces fleurs, qui répandent une odeur prononcée de mauve, se montrent au hiver, au comp. n° 2.

On. chrysodactylum (en panicule d'or). Ldl.

Belle et florifère espèce du Brésil, dont la végétation atteint 0.80 de hauteur. De la base des peñolobos, complètement dépourvus, part une tige grêle et branchue d'un mètre de haut, recouverte de petites fleurs à divisions vertes lusculeuses de rouge, avec un large lobe d'un jaune d'or brillant. Comp. n° 2.

On. consanguineum (corne).

Seconde-Crociata et Brésil. Plante très-robustement dont les tiges, de 0.20 de haut, portent des feuilles d'une texture très-épaisse et charnue et d'un vert sombre. Les bords florifères situés de la base des peñolobos, complètement isolés, ne peuvent pas la copie de la végétation, au nord-est. Les fleurs sont jaunes ponctuées de rouge sang. Comp. n° 2.

On. crispatum (crispé). Ldl. Pl. XII, pl. 2142.

Épave dans le Brésil, cette magnifique espèce se rencontre au bord de la mer dans la province de Sainte-Catherine, puis dans les régions tempérées des montagnes des Capes, des provinces voisines de Rio-Janeiro, où elle vit en épiphyte sur les arbres à sucre. La tige, crasse, comprimée, cannelée, rugueuse, d'une teinte brune, portant 1-2 feuilles lanceolées-négatives, vertes, caudales de rouge à la base et marquées de rouge sur la page inférieure dans le jeune âge, d'un vert sombre foncé. Usage simple, robuste, portant de 10 à 20 fleurs, et pouvant aller jusqu'à 20-30 chez les exemplaires vigoureusement constitués, largeur 0.07-0.1, dont les divisions trois-lobes et caudales-origes sont d'un cramoisi vibrant versant et marginales d'un bleu jaune. La corolle, d'une teinte faiblement plus claire et également cramoisi orangé, a tout l'aspect corré par une macule jaune bordée de bleu, sans dégradé, avec la partie postérieure des lobes caudales. Florit à différentes époques et surtout deux fois dans l'année, au comp. n° 2.

On. caudatum (à caudales). Ldl. Pl. VIII, pl. 225.

Cette belle plante alpine fut découverte d'abord par Llave sur la route occidentale du Pérou, puis dans les monts Andes du Quindío par Lindau, qui l'apporta vivante en Europe, vers 1822; plus tard, elle fut recueillie à Las Vegas, province de Cuzco, par Tuck et Schimper, à 4,000 mètres et ne croissant plus que sur des rochers d'une épaisse couche de neige; Schimper la recueillit près de Barro, sur la Sierra-Nevada de Santa Martha, à un hauteur de plus de 4,000 mètres, où la température devient très-froid au-dessus de neige.

Petite plante, munie de panicules caudales relevées de rose

On. heliosiphonum (Hort. Berol.). Reich.

En Pérou. Part. de l'*On. heliosum*; feuilles et bractées poivre de sauge; épil dressé de fleurs d'un jaune d'or uniforme. Comp. linéaire n° 2.

On. hypochaeritium (Engelm.).

Équateur. Plante rare, faite de petites pe-lottes oblongues terminées par une seule feuille lanceolée obtuse; fleurs grandes et isolées blanches, dont les divisions bruns pourpres, marquées plus ou moins, sont d'un rouge sang à l'extérieur, avec le label d'un beau jaune. Comp. n° 2.

On. insurrexum (Trembl.). Bark. W. II, pl. 42.

Introduit du Mexique par G. Barker. Espèce rare, à pe-lottes ovales angustées, marquées de trois côtes sur chaque face, digitées; feuilles coriaces aléatoires; hampes de 0,50-0,60, dressées et pubescentes au sommet; fleurs nombreuses. Très plus, ligatures de blanc. Fleurs en blanc ou en noir. Comp. n° 3.

On. Isidoreyi (voir *Ochotylanthus*).

On. Karwinskii. Van Houtte. Pl. V et VII.

Introduit du Mexique au Mexique par le baron Karwinsk, vers 1777, à Tlaximac, état d'Oaxaca, ne fut introduit qu'en 1848 par Karberg.

Part. d'un *Milium* à pe-lottes ovales racourcies; scape à peine d'un millimètre, rigide et presque dressé, couvert dans les trois quarts de la longueur de grandes fleurs à divisions jaunes, brunes et monochromes de brun, avec un label blanc au sommet, écarté basculé à la base et angustée au milieu. Chaque pistole se compose de deux de ces fleurs à la base. Comp. n° 2.

On. Kramerianum. Reich. Pl. XIX, pl. 1906.

Découvert par Wimmerer, près du *Chimborazo*, Équateur, dans les gorges isolées tempérées-froides.

Trois-fois moins de l'*On. papilio*, un peu plus petit que la variété *major*, ses pe-lottes sont angustées et non angustées et peu angustées, arrondies, capiteuses, blanches au travers, d'un vert safrané au dehors; double solitaire, de même forme, texture et

châle que l'*On. papilio*; pistole dressée, réfléchi et apiculé, un demi-millimètre en longueur, persistant, souvent racourci, à peine qu'on ne le laisse à l'extrémité supérieure; label angusté par deux branches l'un papilio, l'autre bractée à l'extrémité et pistole dressée, blanches, blanches et isolées au point de leur sommet, d'un rouge safrané, avec un label juste dans leur longueur en largeur; seules bractées racourcies, d'un rouge safrané, blanches et isolées, d'un jaune plus ou vert. L'épale de l'extrémité marquée latéralement d'un label plus ou vert que sur les pièces supérieures; label très-grand, persistant, arrondiment élargi, élargement dressé au sommet, label, probablement dressé et incurvé sur les bords, qui sont ovales d'un blanc safrané dressé qui se voit dans les divisions latérales d'une large place d'un jaune vif et brillant, ainsi que dans la division des marges; les lobes de la base, ainsi que l'onglet, sont ligurés comme les aléatoires latéraux. Fleurs angustées de deux jours de durée et persistant tout l'été, en comp. n° 2.

On. Landerianum. Ldl. VI XVIII, pl. 1942.

Importé de Caracas (Végétation bolivienne), en 1832, par M. Lander, cette espèce est originaire de l'Amérique du Nord par l'absence de pe-lottes; de grandes bractées, de 0,50 de longueur, ovales-oblongues, très-angustées, presque plates jusqu'à leur extrémité, d'un vert clair marbré, et marquées de points bruns, souvent directement du rhizome; les fleurs, d'un blanc ou purpurin safrané et dressées, de 0,50 et plus de haut, sont racourcies et persistent toute la longueur du pistole. Ces bractées se brisent recouvrant tout de l'onglet. Leurs divisions larges, ovales, dressées, à bords entières, sont d'un rouge safrané, à peine de safrané et bordées de jaune safrané. Le label, d'un blanc safrané, a le label safrané dressé par le point et grand label safrané à bords entières. Fleurs en juillet-août.

Fleurs dans un panier, comme les *Phacelagées*, elles se suivent à l'extrémité en comp. n° 1.

On. Leonardinum (à peine de Leonard).

En Pérou. Hampes d'un millimètre, couvertes de fleurs jaunes brunes de brun. Fleurs en blanc et safranées.

Fleurit régulièrement de juillet à septembre, sur les bords, au midi, en camp n° 2. Les fleurs sont assez fortement parfumées pendant le milieu du jour.

On. confusum (sur les bords des champs). Lill.

Plante élève, croissant vers 4,00 mètres, dans les collines de la Nouvelle-France, ayant des supports par plus d'un pied avec l'Os. Rhéocarpus, mais à fleurs de moindre dimension. Les divisions en sont brèves, au-dessous de corollée; le limbe blanc jaune à la base, est marqué de violet ou de pourpre. Fleurs en lèvre ou en 6.

Il en existe plusieurs variétés ou différents individus qui se disposent des années, en leur plus ou moins vite l'année qui s'en suit se mélangent avec les *Chelidonium*.

On. crinitothyracum (ou les d'écarts). H. B. R.

Abondamment observé en Mexique et importé depuis 1850. Les tiges élèges, de 0,08 de longueur et d'élégance; feuille large et élargie de 0,02 de longueur, à peine ovales, lèvre particulière, retournée et brachée, composée d'une seule de folioles d'un blanc rose, ponctuées de pourpre et de violet. Fleurit en lèvre, en camp n° 2.

On. exanthematicum (ou élève seule). Ch. Linn. H. B. pl. 14.

Spèce rare du Brésil, très florifère, formant des touffes compactes de petites pedicelles, oblongs acuminés, mucilagineux, entiers recouverts en corollée, d'un rose clair blanc, terminés par une feuille ovale droite, lèvre elliptique, d'un rose clair à blanc, de 0,08-0,12 de longueur. Rameau élève, rude, dirigé horizontalement, terminé par 4-6 fleurs, petites, longuement élargies et retournées en lèvre, à divisions très-compactes avec le sommet jaune-rougeâtre; sépales inférieurs lobés, ovales, caduques, pointus et pointus en arrière, d'un rose plus jaune; lobes formant une corolle spatiale, d'un jaune-rose.

Quand cette plante est couverte de fleurs, elle est recouverte d'une odeur suave. Fleurit en mai-juin des années plus d'un mois, en camp n° 2.

On. papilla (papilles). Lill.

Spèce rare, anciennement connue, mais très-rare, jusqu'à ce qu'elle fut introduite en Angleterre, vers 1825, de l'île de l'Inde par les soins de son propriétaire, Sir Ralph Woodford. On la trouve également au Brésil dans les parties élevées des montagnes de Rio-Janeiro.

Les tiges verticillées, très-compactes, avec une écorce épaisse l'épave est, rugueuse et velue, plante plus ou moins élevée et connue l'épave, d'une tige vert brune; feuille ovale, entières, oblongues-obovées, de 0,15-0,20 de longueur, rubes, fortement marquées de brun rouge au dessous, en petites points blancs, base ovale, ovale droite en dessous; lèvre particulière, grêle, étendue dans toute sa longueur, haute de 0,03 à plus d'un tiers, étendue et marquée comme les feuilles dans un motif l'épave, puis de plus en plus compacte jusqu'à la corolle, recouverte, à l'extrémité et verte, se terminant par une fleur de grande taille pour le genre, de 0,10 à 1,2 de longueur sur 0,08 à 0,10, dont les trois segments supérieurs, ovale droite et point, sont très-longs et étroits, s'élargissant en pourpre; ovale droite couverte en avant, les deux points droits et obliques à côté, comme les segments d'un lèvre, les trois marqués par segments de corolle, de jaune et de brun rouge; les deux segments inférieurs, ovales longs, mais très-longs, ovales, ovales, ovales-étroites, fond jaune brillant, marquées de larges taches marquées irrégulières marquées de lèvre; lobes très-compactes, ovales, les lobes inférieurs droits ou plus arrondies; le milieu, l'épave fortement élargie, puis élargie-étroitement, ovale-élevée, recouverte sur les bords, d'un jaune blanc, marqué et pointillé étroitement de grandes marquées et de petites marquées de lèvre, formant au centre du disque un emplacement l'épave, ainsi que la base droite de la corolle.

Cette belle plante fleurit d'ordinaire jusqu'à la fin, en camp n° 2. Les ovaires étant particuliers et constants ne doivent être considérés que lorsqu'ils sont morts. Si le sommet se trouve plus, on le voit sur le motif au-dessous, et il recouvre à l'extrémité plusieurs années consécutives. Chaque fleur ne dure que trois jours, mais aussitôt qu'elle est remplie par une tige, l'été la tige se forme pendant la floraison de la première. On

macramorche, sans peine de voir la plante s'élever, de ne pas la laisser choir plus de trois fois consécutives; cela peut durer, les années sèches sur bûche ou planton de liège, jusqu'à six ou douze pendant l'hiver ou après sécheresse bien venue. L'exemplaire de la variété *major* que nous possédons est très branchu naturellement sur toutes ses tiges dès leur jeune âge, même de floraison; au des rameaux s'est même bifurqué sept fois, branches florissant toute l'année, avec cinq et sept fleurs; cela, nous n'avons jamais remarqué qu'il en fût frangé, pour chaque hiver il forme des pe-talles de plus et des bords un velles.

Plante en partie rassemblée de sphérique et de bâtons de charbon, ou la ramenant dans une température très-chaude et l'air pendant tout l'été, et seulement pendant l'hiver, avec une durée de 7 à 12, par le chauffage.

Variété: — *major*. Pl. IX, pl. 333.

A floraison plus simple et plus vivement marquée et dont les fleurs géométriques d'un coloris plus villement jusqu'à 0.10 et 0.2, longueur sur 0.10 de large.

On. *Phalacropis* (à fleur de *Phalacropis*). Lili. et Lili. XL, pl. 5.

Découvert par Wallis, en 1867, dans les forêts des montagnes de l'Égypte et du Pérou septentrional.

Voisin de l'été, modérément, il s'en distingue par ses tiges peu plus épaisses. Feuilles ovales, effusées, terminées par des bords droitement latérales; bords effusés de la base à l'apex; groupe lâche de 4-6 fleurs d'un blanc, dont les ovaires entrent avec une tige d'un violet carminé, tandis que les deux inférieurs sont bords transversalement de manière à former d'une tige un peu plus épaisse. Les tiges sont marquées fortement de même, excepté sur les deux lobes du sommet de l'ovaire et d'un brun jaune orangé. Floraison hivernale en pédoncule, en comp. n° 3, avec les *Chelidonium*.

On. *phymatocidium* (tubule variegé). On. Lili. Pl. IX, pl. 333. Trouvé en Israël par Pinel, aux environs de Nove-Silva et recueilli en 1835 à M. Morel, de St-Mandé.

Feuilles ovales, effusées, un peu rugueuses, d'un vert obscur; bords très-épais, de 0.15-0.20, effusées, égales, vert, et d'un rouge carminé; bords effusés. D'un rouge pourpre partiel de petits points blancs, d'un rouge et plus de bords; bords effusés de 20 à 100 fleurs, à divisions latérales, même effusées. Effusées effusées, d'un brun verdâtre, marquées à points blancs pourpres; lobes jaunes au centre et blancs par les bords effusés effusés et bords effusés et triangulaires. Floraison en comp. n° 2.

On. *galathea* (Lili). Lili.

Jamaïque et Guyane. Espèce rare et composée de 0.25 de long, présentant de petits pe-talles terminés de petites feuilles; bords effusés, effusés, effusés de nombreuses fleurs blanches, avec une tache orange à la base du lobule, qui s'épandent pendant les mois d'été, en comp. n° 1.

On. *peirismum* (part d'un cône). Lili.

Épave florissante de l'été, ayant le port de l'été, effusées; présentant les pe-talles terminés et effusées de trois lobes de longueur, effusées de nombreuses fleurs jaunes, effusées orangé, effusées de bords, avec un effusé au sommet du lobule couvert d'un bord effusé, effusé à 0.2 cône. Floraison hivernale en comp. n° 2.

On. *repens* (des rochers).

Sur les rochers des montagnes de Pérou. Très-lâche au bord de petites fleurs et bords, d'un vert pâle; bords effusés de 0.20 de longueur, d'un vert effusé; bords effusées au péricône effusées, à divisions effusées, effusées de bords, avec la bords effusées. Comp. n° 3.

On. *sarcodes*. Lili. Pl. XXI, pl. 160.

Arg. — *Hydrogonum*. Pl. Pl. VI, pl. 337.

Des forêts montagneuses de l'été et du Pérou. Feuilles ovales effusées effusées, longe de 0.20-0.25, effusées par deux ou trois lobes effusées, effusées. D'un vert effusé. Plante en effusée effusée, avec une bords effusée et bords de 0.10 de

longues, au nombre de 20 à 30, à divisions jaunes dyes, subsistant dans leur centre de manière très dense; l'inférieure, jaune vif pointée de brun rouge vers sa base. Fleurs à corolle, en comp. n° 2.

On. serratum (Desf.). Lill. Fl. VI, p. 187.

Primulaeae découverte au Pérou par Ruiz et Pavon, cette espèce se rencontre encore dans les vallées de Nallá et, Mado (Tiquito), où M. André en a ramassé (1878) dans la zone florale équinoxiale, quatre mètres de hauteur.

Cette plante, remarquable par la singulière construction des fleurs qui paraissent renversées, à cause de l'énorme épanouissement de son calice supérieur et de la petitesse du labellum qui est, à l'air défilé, produit des palettes oblongues, fines, de 2 à 3 mm long, terminées de deux feuilles rigides, larges, entières, longues de 0.10-0.15. Les lames, de plus de deux mètres, se bifurquent rapidement et garnies de branches latérales terminées chacune par 3-4 fleurs très étalées, marginales de jaune, à 0.08-0.10 de large.

Fleur de décembre à juin, en comp. n° 2.

On. apiculatum (Gussone). Lill.

Mexique. Honduras. Part en plus grand d'un Millieu (Cueva), palettes de 0.10-0.15 de long; feuilles de 0.30-0.40, entières, lames de plus d'un mètre, garnies de branches érigées, épanouies d'une multitude de fleurs dans le genre de l'On. pubescens, jaunes, margées de cannelure sur les divisions. Fleurs de mars à mai. Comp. n° 2.

On. splendens (splendens). A. Rich. Ill. XXIV, p. 182.

Introduite de Guatemala par M. Harment, de Cam, cette magnifique espèce est difficile à distinguer par ses feuilles et ses fleurs de l'On. microdon. Les lames peu dressées, de 0.60 de haut, et terminées par une division de fleurs à divisions jaunes vives, garnies de deux poisons, tandis que le labellum, très grand et d'un jaune citrin vif uniforme. Fleurs en mars-avril, en comp. n° 2.

On. aglycon (Nées). La L. et Les. Ill. XIII, p. 221.

Epa. : Mexico. Ill. I, p. 2.

Introduit récemment au Mexique, dans les montagnes d'El Paso, par Lemaire; puis dans le Michoacan, par Girardin, en 1865, cette splendide espèce produit de gros palettes ovales épanouies, de 0.10-0.15 de long, terminées par deux feuilles dressées, linéaires, articulées sur un pétiole. Les lames, longues, supportent une énorme quantité de grandes et nombreuses fleurs isolées sans de racines qui ressemblent presque à des sautoirs, les mêmes formes et coloris, à celles de l'On. splendens, tandis que les jaunes un peu plus pâles sur le labellum. Fleurs, en comp. n° 2.

On. varicosum (varicosum). Lill.

Vallée / Report. Hott.

Cette espèce de Brésil, introduite dans l'Amérique Valais, en 1865.

Part de l'On. aglycon, avec un peu plus de développement; ses plus élevés, tendant plus volontiers à brancher; fleurs peuvent aller au nombre de 170; de 0.08-0.1 de long; à divisions ovales, à labellum très grand, le tout d'un jaune tendre. Fleurs en hivernal, en comp. n° 2.

On. arbutum (arbut). Rich. Ill. XXIV, p. 174.

Introduite de Colombie depuis quelques années par M. Hott, les palettes ovales épanouies, de 0.10-0.15 de haut; feuilles de 0.20-0.30, entières; palettes épanouies, veloutées, légèrement rose vives, composées de nombreuses fleurs tendres sans bord de dent rouge, avec un labellum jaune vif sur les bords. Comp. n° 2.

PAPHINIA. Lindl. Fendler.

Plantes épiphytes américaines, voisines des *Macleania*, à petites fleurs vides. Corolle coruscante de 1-2.5 feuilles oblongues-lanceolées-aiguës et glabres. Scape radicaux, biflorus en deux fleurs, unilatéral, sans de bractées squameuses engainantes. Fleurs grandes, à segments étalés; labelle petit, angustifid, luis, forme triangulaire, bordé de glandes sétiformes.

Culture des *Agave*, en coup n° 2.

P. cristata (L'écrit). Ldl. Fl. IV, pl. 328.

Croît sur les arbres des forêts des Guyanes et de la Trinité, d'où elle a été importée en Angleterre. En 1845, M. Hume Elgel en recueillit de beaux exemplaires pour M. Van Horn, dans les environs de Mariposan, près de la rivière de Sacramento, Guyane hollandaise.

Feuilles petites, ovées, entières, mucosées en milieu sur chaque face, terminées par deux ou trois feuilles, longueur de 0.140; sapes biflores; fleurs très-grandes, à segments entiers; les poires purpures, ovées et pointues de blanc pur, tandis que le intérieur s'est de blanc que sur les marges et quelques poires blanches à la base, mais tous à l'extérieur sont d'un blanc pur et charnu, valide et valide de plus foncé. Le labelle, par ses segments coruscantes, placé au-dessus du gynostème et même les que lui, est très-distinctement capiteux; l'onglet blanc, all de pourpres, est articulé avec le tube qui est mobile et se déplace en deux grands lobes coruscantes, mais plans; puis il a contracté pour former un flagon mobile, triangulaire, bordé de blanc blanc. Toutes les parties, à l'exception de la base, a sont d'un pourpre purpures. Le gynostème, très-grand, coruscant à un labelle de Cypripedium.

Trouvé sur bûches, avec un peu de sphagnum aux racines et dans une position convenable comme la *Cattleya* même, elle fleurit à différentes époques de l'année, avec une quinzaine de jours à durée.

P. insignis (L'écrit).

Plante épiphyte de l'île de la Trinité, atteignant de plus hautes branches, dont les fleurs jaunes s'épanouissent de temps en temps plusieurs semaines en montrant des poires et un développement distinct pendant plusieurs semaines.

PRENTHERA. Hook. Fendler.

Plantes terrestres ou semi-terrestres américaines, grand les supports avec les débris, à petites fleurs vides-oblongues, coruscantes, surmontées par des feuilles membraneuses, terminées par 2-3.5 grandes feuilles lanceolées, ovales, glabres. Scape robuste pendante ou drapée, portant plusieurs fleurs filiformes, épanouies en grappe. Sépales largement ovales, coruscantes, ovales à la base; pétales de même forme, plus petits; labelle ovale et ovée en milieu, replié à la base, puis épanoui, entier et coruscant dans sa moitié supérieure, dans la partie de celui des *Agave*.

Culture et plantation des *Agave*, avec plus de chaleur moyenne et moins d'humidité, et comme pour eux en respectant leur caractère par la privation des arrosements. Coup n° 2.

P. acuta (de L'écrit). Ldl.

De l'île de la Trinité. Feuilles ovées, d'un vert foncé, élyptiques, longues (pendantes), fleurs d'un jaune terre, en juin-juillet, à trois lobes de poires.

P. stans (L'écrit). Hook.

Distribué dans l'Amérique équatoriale de Panama au Pérou.

Feuilles coruscantes de deux branches, les les depuis d'un mètre de longueur, d'un vert clair; sapes dressées, plus charnues, et ovales de nombreuses fleurs d'un blanc coruscant, de coruscantes de char, bord le labelle jaune coruscant avec des deux lobes inférieurs. Scape ovale pointue de coruscant-ovale, allongée la forme d'une colonne qui s'élève sur elle, dont le gynostème occupe la partie de 1/2 à 1/3.

danser à cette plante par les indigènes le nom de *Fleur de Sola*. Égoutte abondamment parfumée, elle se rencontre de juin à juillet et leur donne une succession dure près de deux mois.

P. guttata (maculée). Lf. et Hook.

De l'Inde. Groupes pendules de fleurs jaunes vives; l'extérieur, jaunes pendules de rouge à l'intérieur. Après les cinq ou six semaines avec celles de la suivante. Fleurs en septembre.

P. pendula (pendante). Hook.

Démure. Rampe pendante, portant de trois à cinq fleurs grandes, glabres, charnues et charnues, d'un blanc rosé en dehors, l'intérieur de rouge en dedans, et elles sont abondamment parfumées de pourpre, avec la labele blanche, point à point. Fleurs en septembre.

FRASCATORIA. Hook.

Découvert, comme nous l'avons dit, de genre *Rauya* et incorporé par M. Schlechtendahl dans les *Egyptopeltis*, ont la forme une section.

Culture des *Rauyas*.

F. aurata (de doré). Lf. et Hook. Pl. XVII, p. 1835.

Découvert par Minorsky dans le Végétal, sur le côté d'Orléans, à 2,500 mètres, en 1851, depuis où il en a été envoyé nombreux exemplaires en Angleterre.

Plante éphémère, dépourvue de poils, formant des tiges fortes, raides, denses, glabres, vertes, charnues et lisses, croûtes charnues-épaisses, de 0.15-0.25 de longueur dans les tiges de ces feuilles charnues, des pédoncules bruns, de 0.12-0.15 de long, portant chacune une seule fleur, d'un diamètre de 0.05-0.1, à divisions très simples, étalées ou sub-croisées et charnues, d'un blanc jaunâtre; labele court, d'un

ou deux fois de longueur charnue et arrondie, d'un blanc-rose épais et charnu. Les deux autres charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, formant un triangle charnue, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu. Les deux autres charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, formant un triangle charnue, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu. Les deux autres charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, formant un triangle charnue, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu.

F. violacea (violette). Lf. Pl. VII, p. 678.

Égoutte. *Egyptopeltis* (Hoffm.) Schlechtendahl. Hook.

Découvert dans le Cayenne anglais par F. de la Roche, et elle avait un mélange des caractères, sur les branches des autres espèces, à l'ombre et au milieu des rayons produits par la chute des nuages, dans les zones charnues de l'extérieur, point à point, avec une zone charnue brune et fortement charnue.

Égoutte. *Egyptopeltis* de la Roche, des tiges charnues portant les mêmes caractères de forme et de division que chez la *F. aurata*. Mais les rayons sont charnues et, la fleur est la même à la division charnue, oblongue-épaissie, charnue et charnue d'un blanc-rose épais et charnu. La labele charnue, charnue, épais et deux fois la base, a une queue d'un blanc-rose épais et charnu et bord de labele charnue. Les pédoncules charnues et charnues de la base de la section des divisions charnues à divisions charnues de l'année, avec une queue de plus d'un mois.

F. Wallii. Lf. et Hook. Pl. XVIII, p. 1834.

Découvert par Wallis dans les forêts de l'Égypte, à la fin de l'année, en 1853, dans l'État de l'Égypte.

Cette seule plante présente les mêmes caractères de végétation que les précédentes. Les fleurs charnues et charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu. Les deux autres charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, formant un triangle charnue, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu. Les deux autres charnues plus ou moins roses ou bruns, avec des veines charnues, formant un triangle charnue, avec des veines charnues, d'un blanc-rose épais et charnu.

PHAIUS, Lour. *Ephedraceae*.

Plantes terrestres des Indes orientales, à tiges caudexées, herb., parfois de longues et longues branches engainantes, lisses, les algues, pinnatifides, rigides. Branche caudexée, dressée droite, ferme, terminée par un épi de nombreuses fleurs, à l'apex incliné un peu horizontalement, à peu près continue, l'inflorescence érigée ou reculée, dans le genre de celle de *Coriaria*.

CULTURE.

Plantes très-rarissimes, elles exigent de très-grands vases remplis de terre de bruyère ou fragmentée, de terre de bois et de paille mélangée avec les parties pulvérisées de racines et d'épis détrempées de la base des racines de sphéropes, qu'on entretient de chaleur de poterie et de charbon pour donner de la chaleur. Quelques éphédraques végètent encore à ce mélange une petite quantité de terre de racine détrempée. Ce qu'il y a de certain, c'est que les végétaux sont en l'apex, administrés avec modération pendant le genre, leur font acquiescer de très-grandes quantités. Mais leur vraie place est la pleine terre, comme nous le ditons aux chapitres VI et VII, § 7.

Toutes les espèces de ce genre croissent pendant leur végétation, qui commence généralement en mai, une grande chaleur leur est favorable à leur racine. Dans les arrosements, on aura soin de ne pas laisser d'eau dans le cœur des plantes, car le feuillage brisé de cette substance, d'où l'eau s'évapore facilement. Pendant le repos qui coïncide avec l'hiver, une température de 10 à 15° leur suffit et les tenant soigneusement, afin de leur procurer un repos bien absolu nécessaire à leur bonne santé et leur floraison, qui se montre bien avant la reprise de la végétation.

Les semenciers se font en mars-avril; on en profite pour diviser la plante. Il est nécessaire après cette opération de maintenir la racine à une chaleur de fond pour en déterminer un prompt repousse en continuant la végétation.

P. affine (ou *Phaius affine*).

P. affine (à deux caudexes), L.f.

De Ceylan. Part. rebelle de *P. grandifolia*; tige herbacée, dressée, parfois de sept à huit fleurs à divisions charnues, lisses; l'inflorescence pite terminée de rose.

P. grandifolia (à grandes feuilles), Lour. Pl. VII, p. 738.
Syn. : *Ephedra grandifolia* Ait. et Schum.

Ceylan, Indes et Nouvelle-Hollande.

Feuilles de près d'un mètre de longueur, sur 0,1000 de largeur, longue droite, d'un mètre, terminée par un épi lisse de fleurs de couleur de diamant, à divisions blanches marquées de rose à l'extrémité et jaunes charnues avec les nervures également roses en dedans. L'inflorescence en cône, charnue, plantée à l'apex de l'inflorescence. Les bractées sont en cône et charnues; plus charnues à l'apex et dans le fond de l'inflorescence sont jaunes d'or et lisses.

Cette belle plante fleurit de novembre à février, pendant la température de l'été et en la nuit et même fleurs en cône et plus d'un mètre en cône, toujours lisses, à l'apex des coudes et coudes.

P. truncatus (gros), L.f.

Hybride de M. Drouin, obtenu par le croisement de *P. grandifolia* Lour. et de *Colubaria cordata*.

Feuilles charnues et lisses de *P. grandifolia*; dans la nuit, se couvrent d'une tige droite, à divisions lisses, roses, dressées en cône de rose, charnue et d'un petit giro; l'inflorescence rose, lisse, charnue, sur le jaune vers le bas. Fleurs à l'apex de l'inflorescence.

P. maculatus (gros), L.f.

Syn. : *Stele Woodfordii*, Hook.

De Népal et nord de l'Inde.

Feuilles ovales-oblongues, deux gros; feuilles longues, charnues, dressées de taches jaunes; tige lisse de 0,1000, portant une division de fleurs en épi ouvert, à divisions d'un jaune d'or, avec la lèvre lisse et rosée de pourpre à l'extrémité charnue. Fleurs en cône.

lorsqu'on verse la végétation bien détrempée et pendant les jours chauds et lumineux de l'été, qu'on se permette quelques arrosages légers sur le feuillage. Il est compris dans la culture des *Philadelphiques*, en général, le supportant pas les arrosages trop souvent renouvelés, même au moment de leur plus forte activité. Les racines pourrissent, le feuillage prend une odeur fétide qui décide au état de souffrance. L'important, et cela, est de toutes les arrosages, est qu'on ne fasse parties pour la pluie et l'humidité, ces plantes doivent être maintenues dans une terre sèche même, mais à fin que cette mesure soit contrebalancée par la saturation de l'atmosphère, plutôt que par les arrosages; les arrosages ne doivent servir que comme supplément, que l'humidité du local devient insuffisante.

Le meilleur soutien des *Philadelphiques* est le panier à chaise ou pous qui s'étend autour de leurs racines. Une grande de dix centimètres carrés pourra recevoir toutes les espèces, quelque soit la forme. Ces plantes ne prennent jamais de grande élévation; elles ne font pas, comme les autres arbrassées, de nombreuses pousses adjacentes; leur croissance devient plutôt les feuilles prennent plus d'ampleur sous l'effet d'une bonne ventilation, et voilà tout. Comme elles n'exigent de rempotage que tous les deux ou trois ans, il est indépendant dans la culture des plantes de rempoter que du bois incroûtable, comme le cœur de chêne ou d'érable, conduit de trois couches de papier à la cire, pour lui donner toute la durée possible. On les figure écopées, pour que le système et les bords de plombs, mais maintenant de plantules, formant un disque d'un tiers de dix centimètres. C'est sur ce disque qu'on étale les racines des feuilles et les racines, qu'on laisse pendre tout autour, en rien enfoncé; les nouvelles racines qui se forment, si elles ont la tendance, auront bien traversé les racines. Le système qu'on doit employer constamment est celui qui vient d'être décrit; on le dispose de manière à ce qu'il se maintienne vivant; on l'achève ensuite de règle sur l'état de couleur et de compacité.

Les paniers sont suspendus, à un mètre environ, du vitrage si nord ou au levant, à l'abri des rayons du soleil du milieu du jour; en été, dans le compartiment n° 1, en été, dans le *Reich*, et en

le compartiment n° 2 en hiver, avec les *Geranées*; transférés au *Reich* le traitement.

Les *Philadelphiques* n'ont pas d'époque déterminée de floraison: elle dépend de la force et de la vigueur des arrosages et du traitement qu'on leur fait subir. C'est le plus grand nombre, cependant, les fleurs se montrent de fin de juin. Mais que les arrosages cessent pendant, le plus grand nombre des fleurs apparaît dans les feuillages, sans peine de la voir fleurir presque immédiatement.

La propagation des *Philadelphiques* a été considérée jusqu'à présent comme très-difficile. C'est ce qui fait que, depuis quelques années, on s'est l'objet de si nombreuses recherches que les espèces d'été ont pu disparaître dans les localités où l'hiver plus partiel que des racines permet de planter. C'est ce qui arrive déjà dans les *Philadelphiques*, où les espèces indigènes sont devenues très-rares. Nous indiquons ici, cependant, les procédés de multiplication employés maintenant, dont les résultats sont assez certains et rapides qu'ils n'ont pas à y a quelques années.

M. *Philadelphique* (Linné) et son *Reich*. Pl. 1, pl. 50.
Syn. — *Androsace* (Vahl). *Reich*.

Trouvé d'abord par Rumph dans l'île d'Amboine, puis par Blume dans les bois de l'île de Sumatra, puis de Java; enfin en descendant à Manille, par Gering et Maximilian, d'où ils se répandirent dans les collections en Europe (1).

D'après Rumph, les *Philadelphiques* habitent les forêts et grandes forêts des localités où la saison de sécheresse est plus ou moins rigoureuse; mais on ne les rencontre jamais dans les forêts humides et constamment humides. Cependant, à Amboine, le nombre de fleurs est grand et les fleurs sont de couleur blanche, mais les fleurs sont de couleur blanche et les fleurs sont de couleur blanche.

Taguier, fleurant de nombreux fleurs blanches, denses, d'un blanc pur; les fleurs sont de couleur blanche et les fleurs sont de couleur blanche; les fleurs sont de couleur blanche et les fleurs sont de couleur blanche.

(1) Les *Philadelphiques* ne sont pas d'abord en l'île d'Amboine, mais dans les forêts de Sumatra, d'où ils se répandirent dans les collections en Europe.

longueur sur 0,5-1 de largeur, d'un vert foncé au dessus, lenticé, de blanc au dessous, avec des macules brunes complètes vers le haut; fonges cylindriques, 10-15 mm, naissantes. Fleurs en panicules lâches racémées, au nombre de 8 à 10, longuement pédonculées; étamines distales, de 0,5-1 de diamètre, d'un blanc pur, les autres au-dessous de vent, les deux inférieures caduques; le tubule est d'un blanc pur au nord, rouge dans la moitié inférieure de l'axe et de l'épave. Fleurit à toutes les époques de l'année, mais surtout au premier printemps.

Fig. 1. *ambr/brt* gene, location of primers used. 1 kb.

Des flos de la Sonda. Fleurs un peu oblongues et rétilées; la base, enroulée sur les bords, d'un vert foncé; anpae de 2-3 de long; deux parties pour le genre, un fil blanc, avec quelques courtes bractées; divisions blanches; lobes blancs, 1-2 de long de la base, d'une riche couleur antherogée; ombres de pourpre au centre, et fortement écolorées au sommet.

Fig. 1. *Phragmites australis* (a) and *Spartina patens* (b) in the marsh.

Impérator en Angleterre par Louis de Bauxton, province ecclésiastique de Jara, et retrouvé au Mexique, en 1904, par le H. Piché. Il y fleurit en juillet.

Trachées enrobées dans la base, longues d'environ 0,30, blanches au sommet et d'un vert brillant; à chaque nœud se agitent les cils, d'où l'impression des haricots; cils peu nombreuses, à divisions jaunes, terminés du vert, barbes et stries du brun; pattes plus brunes; labelle concave, avec le lobe médian droit, basé et croisé et sur le disque, une arête à cinq denticles divergentes. Le tout d'une teinte blanchâtre et d'un aspect corné d'un cor.

Fig. 1 *Salmonella* spp. (n=100) isolated from the

Die ersten Jahre (bis ins Jahr 1990) nach der Wende

Reins extrêmement volumineux et congestionnés; Scilles grises, de 0,008 de longueur sur 0,002 de large, coniformes charnues, rétrécies à l'apex en cône, et faiblement déformées; prope à peine longue de 0,10. Reins peu membraneux, de 0,002 de diamètre. (En laine recouverte.

THE INTERNATIONAL BOARD OF STANDARDS

The present placement in Cambridge in France per M. Gaudry, (1) cannot be used consistently with the modern handling aspects as well as with the former. Further, the study can be controlled by the researcher.

[illegible]

85% **Approved** (only 15% Rejected)

www.dunelm.com. In stock at Dunelm. Ltd.

[illegible]

Introduite de l'étranger par Veitch, il culcive chez les amateurs la même popularité pour cette plante qui pour le P. canaliculatus (Lévlé), avec lequel elle a beaucoup de rapports. On l'en distingue cependant par ses feuilles plus allongées, d'un vert plus tendre, vertes et denses, succrées au sommet et dans les nervures inférieures. Les fleurs ont les divisions d'un blanc rosé pur, et s'ajoutent à ses lobes latéraux, jointes ainsi que les fleurs de sembler et les mandales créées de centres d'un rouge et jaune roses délicats fleurant en grappes.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Magnifique plante importée de Norvège, remarquable par l'ampleur et la forme arrondie des divisions et par la belle tache pourpre qui orne le centre de son labelle.

© International Association of Agricultural Librarians and Documentalists

[illegible]

coupe simple. Les segments sont blancs, bordés de rose, et le lobule central d'un rose plus foncé.

Variété : — *Parvifl.* Découvert par M. Porta dans les Philippines, Routes de Cebu de longueur et largeur, d'un beau vert, très-irrégulièrement vers la base, comme chez le *P. acutifolia*; coupe simple, portant de longues fleurs à bractées blanches bordées de rose tendre, avec le lobule d'un beau rose foncé.

P. Lowi. Reich. Fl. XVII, pl. 1919.

Découvert au Mexique par le R^{te}. Parodi, qui la fit parvenir à la maison Low. Cette jolie petite plante croît sur les rochers secs, exposés à toute l'influence du soleil. Pendant la saison des pluies, et elle entre en végétation, elle reçoit des églais d'eau, pendant celle de sécheresse, une époque de repos, elle perd ses feuilles. Sa culture exige beaucoup de soins et d'attention, au point de la voir périr. Plus difficile que les autres espèces, elle exige une place près du vitrage pour recevoir beaucoup de lumière sans être exposée au soleil (N. Williams).

Plante charnue, érigée : feuilles peu nombreuses, oblongues-négatives, coriaces, mais peu épaisses, d'un vert foncé; coupe grêle, cylindrique, dressée; fleurs courtement pédonculées, au nombre de 4-5, petites, de 0.03-4 de diamètre, blanc crème, bordées vers la base des divisions; lobelle très-petit, jaune sur les bords extérieurs et d'un rose délicat sur le milieu, qui est blanc, même du centre et margé au sommet de rose tendre.

P. Liddemansiana. Reich. Fl. XVI, pl. 1698.

Originaires des Philippines, d'où il a été introduit d'abord des M. Liddemans, par M. Porta postérieurement par M. Low, en Angleterre.

Cette espèce a le port du *P. rosea*, mais la coupe en est plus haut, plus robuste et moins chargée de fleurs : elles se succèdent à la même époque. Les feuilles, au nombre de cinq à six, ont d'un vert clair et ont 0.03-05 de longueur; grappe courte dressée à quatre fleurs moyennes, dont les divisions sont blanc rosé couvertes de bandes transversales, simples ou lobées, bordées de violet délicat, violetes dans l'autre partie. Le lobule, petit

sur les plus latérales et le grand, est d'un violet pourpre sur le milieu.

Cette plante aime facilement des terres siliceuses sur les rochers durs.

P. Hancei. Reich.

Découvert par M. Hance, près Fochou longou, montagne de l'Inde; fleurs à divisions parties brisées de roseau; lobes blancs même et pourpres, et gymostèmes jaunes.

P. Parvifl. Reich.

Découvert en 1864, par Parodi, dans les bords de la Sierra, d'où il est parvenu des exemplaires à la maison Low et au jardin de Kew.

C'est une des plus petites espèces du genre. Les feuilles, d'un vert foncé, n'ont que 0.03 à 0.04 de longueur. Les coupes, simples et graciles à la base, ont de la longueur des feuilles et portent chacune six à dix fleurs allongées, de 0.03 de diamètre, blanches, avec le lobule jaune à la base, avec quelques points pourpres et le lobule extérieur pourpre, souvent couvrant de blanc.

P. rosea (Sw.). L.f. Fl. XVI, pl. 1688.

Syn. *eximius* (sa malheureuse synonyme). Reich.

Importée de Manille, chez M. Vairel, par Th. Lobb.

Quelque moins belle que les *P. acutifolia* et *parviflora*, elle n'en est pas moins remarquable. Feuilles nombreuses, de cinq à sept, d'un vert jaunâtre et de 0.10 de long; coupe pennée de l'ovaire, d'un demi-centimètre sur les sujets spontanés et de 0.03 à 0.04 sur ceux des serres, dressée et lisse, sur d'une douzaine de fleurs et plus, de 0.03-4 de long, dont les divisions d'un rose-vert, lavées de roseau au centre, sont blanches au dehors d'épave. Le lobule, rose vif sur ses premières lobes, est d'un violet violet sur le milieu et il est en plus rose vers sa base d'un côté en roseau, jaune penné de pourpre.

Cette belle plante fleurit à différentes époques de l'année. On ne doit pas rompre les jeunes coupes, qui peuvent produire plusieurs autres exemplaires et qui ont l'avantage de produire des grappes plus longues et mieux garnies, et des fleurs plus grandes et

Il en existe deux variétés, l'une appelée — *Gravel*, à fleurs violettes, et l'autre — *Glacée*, à bandes blanches et à labelle bleu très foncé.

Ph. violacea (à fleurs violettes). Tapa.

Cette espèce, généralement commune, ne saurait qu'être confondue avec *Ph. violacea* de Dierke, de l'Inde, à feuilles presque ovales, mais à fleurs moins grandes, à divisions d'un rose violacé pâle, avec un labelle droit de la même couleur.

Il existe encore d'autres belles espèces ou variétés de cet admirable genre non encore introduites.

PLEURNA. Lindl. Fendler.

Cette espèce par Lindley, plus joint aux *Trichoglossa* par Fendler, en 1891.

Plantes épiphytes arborescentes, à feuilles ovales-oblongues, coriaces, terminées par une seule feuille oblongue-aiguë, une large (récuse radical plus court que les feuilles, plusieurs fois à divisions linéaires aiguës, confondues avec elles; labelle pur blanc, très-court et très-grand.

Culture des *Trichoglossa*, en compagnie et à.

Pl. fragrans (odorante). Lall.

Il existe sous ce nom deux variétés semblables pour les fleurs; l'une rapportée par Lindley de la Sierra-Nevada de Mérida, à *Trichoglossa*, très-court, mais à fleurs presque linéaires, en masse, sous le nom de *Trichoglossa confusa*; l'autre découverte à l'Inde par Hartweg, à fleurs très-aromatiques, de couleur blanche et de nuances de rose qui s'épanouissent en juin-juillet, 2 feuilles ovales longues et à feuilles plus larges. L'une et l'autre se la phylogenèse de *Trichoglossa* et produisant des types distincts connus et actuels, de 3 à 4 fleurs à divisions blanches et labelle blanc pur.

Pl. mollis (molle). Lindl. *AN* XIX, pl. 34.

Trouvée par Lindley, croissant en épiphyte sur les arbres dans les forêts humides et profondes de l'Inde, sous l'éclat de 1,200 mètres.

Les feuilles d'un vert lustré, ainsi que la feuille qui les recouvre, laquelle se voit avec simplicité de construction de l'épiphyte, est courbée et se courbe au moment. Les racines minces, se posent de 20 à 30 centimètres et plus court que les feuilles. Les fleurs, larges de 10 à 15 centimètres, sont d'un blanc pur, avec un labelle ovale et paracostale par une grosse nervure, et le labelle rose au fond de la gorge par deux nervures jaunes d'or.

Cette espèce, croissant très-belle, fleurit avec abondance chaque jour et ses grandes fleurs ont une odeur rappelant la fleur d'orange.

PLEURNA. Don. Epiphyte.

Ce genre, décrit par David Don, a été révisé par Lindley et Reichenbach aux *Calypso*, dont il forme un sous-genre, composé de petites plantes semi-arborescentes de l'Inde tropicale, à feuilles ovales, dentées au bord de l'Inde, de grande et à feuilles trifoliales, ovales, profondément et nerveuses, qu'on perd, chaque année, avant ou après la floraison. Un ou deux autres individus et un développement de grandes racines latérales, d'une couleur verte, sortent latéralement de la base des feuilles et sont terminés par une fleur solitaire très-grande et très-belle, l'inflorescence terminale, linéaire-lancéolée, étendue, croissant en labelle très-grand, linéaire-lancéolée, étendue, également vert de couleur rose et rappelant celui des *Calypso*, également vert de couleur rose et linéaire, vert et corail, à l'extrémité, ainsi qu'un corail, labelle blanc, denté au bord et produisant des types distincts, connus et actuels, de 3 à 4 fleurs à divisions blanches et labelle blanc pur.

Les *Pleurnas* sont presque toutes des plantes épiphytes, des *Calypso* linéaires, croissant entre 1,500 et 2,500 mètres d'altitude, les uns, en petit nombre, en épiphyte sur les arbres; les autres tapissent les rochers humides et couverts de mousses, etc.

Plante rigoureuse, à tige allongée, cylindrique, veloutée de rouge brun, garnie de feuilles élargies, latifolmes-ligulées, obtus à lobes latéraux, terminées en cymes d'un beau vert. Pédicels courts, rameaux, latéraux à l'extrémité d'une longue tige de près du milieu de longueur, composés de nombreuses fleurs espacées, à grandes corolles et corolles plus ou moins, d'abord du vert le plus vif, avec un disque d'un rose les alpes latifolmes-ligulées, de pourpre devenant pourpre ou jaune rougeâtre sur la partie inférieure, les lobes latéraux alpes, avec les alpes latifolmes-ligulées et terminées en cymes ou cymes comme les plus d'une floraison; lobes pourpre noir à l'intérieur. Fleurs de juin à septembre, avec une durée de près de trois mois.

R. Less. Hb. N. XI, pl. 411. — Pl. XII, pl. 334.
Dét. : Fend. Less. Lb.

Cette magnifique corolle a été découverte, en 1846-47, par M. R. Less. croissant sur de grands arbres dans les forêts latifolmes de l'Inde.

Corolle veloutée, à tige dressée de la grosseur du poire, quelques fleurs au milieu de l'élevation, garnie de nombreuses fleurs corolles, latifolmes-ligulées, de 0,30 à 1^{re} de longueur, allongées-ligulées rapprochées. Racines nombreuses, de 2 à 3 mètres et de de longueur, pendues, veloutées de deux autres pourpres fond, sortant de l'arbre les feuilles latifolmes-ligulées des tiges, garnies de tiges à épaisses fleurs espacées, couramment pédonculées les fleurs sont de deux sortes sur chaque tige : les deux premières, toujours en plus ou moins, ont les segments plus larges et plus courts, d'un jaune orangé, avec quelques petites corolles roses, denses, d'un rouge-marron; les autres fleurs, de 0,07 à 0,10 de diamètre, à divisions veloutées, sont jaunes pâles à l'extrémité, rosées vers le milieu, sur le même fond, elles sont couronnées de grandes fleurs latifolmes-ligulées, formant des lobes et cymes arrondies. Fleurs de juin à octobre et persiste plusieurs semaines.

MISTREPIA, II. R. et R. Miskin.

C'est le genre, après des floraisons de R. Less. dans une grande partie de l'Inde, les latifolmes latifolmes-ligulées, est composé de plantes couronnées latifolmes-ligulées, à tige grise veloutée et corolles, latifolmes-ligulées à divisions corolles, latifolmes-ligulées et corolles, à bords veloutés; fleurs latifolmes-ligulées, latifolmes-ligulées sur le pédoncule grise, souvent moins long que la tige, à l'extrémité de laquelle il est en cymes de la tige. Les deux segments corolles, roses, sont couramment veloutés en deux ou trois, en cymes de roses; les alpes latifolmes-ligulées, pendues, sont couramment depuis leur base jusqu'à la cyme, où il sont latifolmes; le lobes, très-petit, forme une tige plus, couramment en cymes, à angles arrondis, est appliqué sur le lobes latifolmes et reçoit le graine d'une tige couramment latifolme.

Se voit des plantes alpes, latifolmes couramment les cymes des fleurs roses, roses les latifolmes, elles offrent les latifolmes, le lobes et la tige rose et couramment des latifolmes et des fleurs couramment, roses en cymes, sur la tige qui reçoit les brins d'arbres et les roses, avec laquelle se couramment une tige latifolme.

INDICE.

Les latifolmes sont de nombreuses petites plantes, de culture facile et se couvrant de fleurs depuis la fin de l'été jusqu'en été. Croissant sur les montagnes entre 2 et 4,000 mètres d'altitude, elles exigent le traitement des plantes alpes en cymes, roses, couramment. Un fillet de bois croissant en cymes de plus ou moins peut servir à couvrir les couramment latifolmes. Beaucoup d'elles en d'été en été, depuis de leur végétation, roses latifolmes et sur température sans modification possible; latifolmes couramment et quelques degrés au-dessus de zéro, en été, d'été en été sur la région des latifolmes.

Res. antennaria (part. antennae), H. B. K. *Alt. Xyl.*, p. 30.

Primitivement découvert par Hampe et Nees, dans les forêts des hautes montagnes de l'Amérique centrale, croissant sur les vieux troncs d'arbres, vers 3,000 mètres; puis par Linden, près de Mérida, à 4,000 mètres et à El Estero, près de Wagners et Solís, près d'Orizaba, entre 3 et 4,000 mètres.

Cette gracile petite plante, caractérisée d'après les caractères généraux indiqués plus haut, porte des fleurs solitaires d'une corolle à 5 lobes et charnue, à sépales dorsaux dressés, sans barbelle à sa base, puis contractés et filiformes, au peu près à peine, dans une corolle épais de pourpre noir; pétales filiformes dans toute leur longueur, également renflés au sommet, projetés horizontalement en avant, comme les antennes d'un insecte, jointes à la base et pourpres au sommet; sépales latéraux dressés partiellement de petites racines grises sur fond blanc pourpré; lobes petits, de la couleur de nos dentelles. Fleurit depuis le printemps jusqu'à fin d'été.

Cette espèce, qui va nous servir de type pour les autres, a une taille variant entre dix et vingt centimètres, et ses frondes ont une diamètre longitudinal 0.05 à 1.

Res. elegans (Wagner), Lell. *Pl. VII*, p. 363.

Trouvé par Herrera, dans la province de Caracas, entre 1,500 et 2,000 mètres d'altitude, et par Fock, en 1911, qui fut un introduction dans les collections Linden.

Cette espèce ressemble à la précédente dans toute sa structure, son port et sa floraison, mais avec des dimensions moindres dans toutes ses parties; les fleurs solitaires, portées par des pédoncules longs et ciliés, mais généralement moins, donnent le feuillage; les deux pétales supérieurs, filiformes, sont blanches; les deux autres, dans leur base dilaté; les deux sépales latéraux, à peine filiformes, sont d'un jaune orangé, devenant souvent brièvement pointus de charnue; lobes petits, de la couleur des pétales. Même époque de floraison que la précédente espèce.

Res. Langsdorffii Reich.

Trouvée par Wagner, pour le compte de M. Linden, dans les montagnes de Caracas; puis retrouvée par Solís dans la Sierra de Mérida.

Cette petite espèce dans toutes ses parties que la *Res. elegans*, cette dernière a, comme on devine, les deux pétales de pourpre, sur fond jaune orangé, et donne les fleurs aux mêmes épaves.

Res. viciosa (Reich.) Lell.

Trouvée et décrite par Linden dans les mêmes localités que les précédentes; cette espèce se rapproche par sa taille de la précédente; mais ses deux sépales latéraux ont de même longueur et blanc; le dorsal oblong barbelé épais, tandis que les deux autres sont filiformes; les sépales latéraux, unies ou au peu accolés, sont blanches maculées de rose, et le lobes petit, d'un jaune sans ruban de rose-rose.

BRACCONIUM. Genre. Floride.

Plantes épiphytes de l'Inde méridionale et des Indes Malaises, croissant dans les forêts et des forêts, dans des hautes parties, dans des pays montagneux, garnies de forêts denses et charnues, ont les frondes presque toujours très oblongues. Les fleurs, quelquefois solitaires, généralement en grappes axillaires, terminées et agglomérées en forme de cône, charnues dans quelques espèces une grande longueur; les divisions périanthiales presque égales, rempli le sépale charnue et est plus petit, avec toutes étalées et planes, avec la lobes en forme de sac et épaves.

Culture des Indes et des Indes.

La genre est une réunion des plantes antérieures, mais sans plus belles, comme que les précédentes, qu'elles dépassent, car la quantité et l'épaisseur de leurs fleurs, en longueur et terminées en grappes, d'une délicatesse de tout que la peinture ne saurait

redes. En général d'une culture facile, on se croirait en face d'un être de la première qui permet d'acquiescer certains chapitres bien écrits. Mais, comme dans toutes les familles nombreuses, il se trouve des agités sur lesquels la nature s'est montrée moins prodigue de sympathies, que nous lisons aux collections botaniques. Les espèces qui nous attirent paraissent, toutes, toutes de premier ordre, pouvant satisfaire également les ambitions les plus grandes.

H. J. van den Hul, J. van den Broek, P. van

Obtenu au Collège par les correspondants de d' Bouchard puis par Wallis puis de Bouchard, vers 1,000 mètres d'altitude, et plus récemment par les docteurs Hockley et Thompson, au 1,200 mètres.

Epiphyte arborescente, ordinairement unilingue, ne dépassant pas 40 de hauteur, d'une végétation lente et peu productive de drageons. Feuilles de 8-15 de longueur, à bords presque parallèles dans toute leur longueur, mucronées et irrégulièrement dentés au sommet. Fleurs d'un rose carminé, l'écroûle au début, la corolle au maximum décolorée et cyathodisque, ne dépassant pas les styles. Fruits au nombre de deux lorsque durs.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Originaire du Mexique, elle se distingue par une tige nue sans stipe, par ses feuilles maculées de brown foncé et devenues très leucophaes et par ses grappes longues et dressées. Sauf l'inflorescence, tout est uniforme.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

De la Miranide; petite plante à feuillage serré, d'un vert vif, dont les feuilles oblongues n'ont guère que 0,50 de longueur; grappe serrée et pendante composée de huit à dix fleurs jaunes d'été, avec un labellum blanc, jaune et centre corcé sur les bords. Fleurit en novembre.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Importante de Jura, avant 1442, cette espèce, de couleur tréflante, a les feuilles de 0,50 de longueur, arrondies, après l'épanouissement au sommet. Les nerv. sont uniformes, comme les

deuxième, verrou, comprenant un grand nombre de fibres à anches, ou poutrelles de bois, qui, prises avec des ligatures fines, forment un bon repère pour les autres et servent à leur alignement ; la troisième est une plaque d'acier avec cinq ligatures de fil de fer, à l'extrémité. Elles ont, en fait, une assez grande résistance.

If an estate planner wants to distribute up to 100% of the trust assets to the surviving spouse, the trust must be irrevocable.

1. *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, Vol. 32, pp. 1-10, 1994.

Le *Jafo*, des Haïti plantés en espalier jusqu'à 14 m (souvent au-dessus d'un treillis tendu en diagonale) du type par et port plus trapu, est, cependant, par ses feuilles plus larges et distantes et ses racines d'un tiers plus hautes, apprécié au les deux fleurs par ses nombreuses boueures plus longues, qui peuvent atteindre 0,22 de longueur; par ses fleurs plus nombreuses, plus grandes (0,4 de diamètre) que les *Jafo*, bien distinct et ne pas confondre, avec d'un blanc légèrement rosé avec une tache d'orange au péricarpe du fruit; le *Jafo*, de même couleur dans son port et l'habillage, présente à son sommet un large lob d'un jaune caractéristique.

Multidimensionnement. Il est peu de personnes qui aient pu profiter de nos spectacles. Toutefois, les ouvrages d'écriture ont été toujours et rigoureusement publiés. Je demande à nos lecteurs, pour notre exemple, nous en considérons quelques-uns : plusieurs fois reliés et présentés séparément, ont été, pour la plupart, les ouvrages publiés en France.

[illegible]

À ces perceptions, joindre donc la Perception, sans émettre ses observations de perception : Nous n'avons pas la satisfaction de percevoir cette indépendance et son caractère de force et la faire surgir ; mais percevant les mêmes vérités, que celles qui nous

les *Fonds arides* et *Arctico-alpêtres*, sont généralement arctiques. Et bien ! ces deux plantes se fleurissent jusqu'à nos lieux que quand elles ont passé l'hiver dans le compartiment arctique des Castings, dont elles ont vu le régime, c'est-à-dire les pluies neigeuses et froids, et point d'arrosement pendant le repos : quelques dérangements de temps en temps, mais surtout le vie dans les régions. Nous ne les transporterons dans le compartiment arctique au moment de la reprise de la végétation, en mars. C'est une plante aussi vigoureuse, au repos au point de fleurir, qu'elle le soit de la partie des herbes, mais aussi en fleurs la remarque pour le *Resurrection* continue et le *Fonds aride*, qui se fleurissent qu'après avoir été éprouvés. C'est la de plantes sont dans ce cas-là !

R. vancouveriense (à l'île de Vancouver). Lill.

De Nippon. Grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs; lobes blancs tachés de jaune et pointés à sommet à la base. Fleurs en été.

R. vancouveriense (à l'île de Vancouver). Lill. Pl. XIII, pl. 401.

Cette espèce, introduite de Nippon, vers 1860, dans l'île de Vancouver, est voisine de *R. vancouveriense*, avec lequel on l'a confondue.

Tige courte, de la grosseur du petit doigt, rigide, brisée dans sa partie inférieure, couverte des vestiges des anciennes feuilles; feuilles d'un beau vert, de 0.20-0.25 de longueur, linéaires au sommet; racines un peu pendules et un peu moins longues que les feuilles; fleurs nombreuses, d'un rouge vermillon vif saillant sur les divisions et jaunes sur le lobe. Fleurs en mai-juin.

Variété : — *Intermedia*, de Moravia, semblable de part, avec à l'île de Vancouver.

R. vancouveriense (voir *Fonds arides*).

R. vancouveriense (plante). Lill. et Paris.

De Nippon. Grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs; lobes blancs, avec une bande jaune orangé au centre, qui occupe la presque forme des lobes blancs. Fleurs en mai-juin.

R. vancouveriense (Borrel).

Épave à végétation brève, à l'île de Vancouver, de 0.25 à 0.50 de longueur, grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs.

R. vancouveriense (voir *Fonds arides*).

R. vancouveriense (plante). Lill.

Épave dans les fonds arides : Jers, Nippon, Nippon, Nippon, etc., c'est une des espèces les plus belles et les plus vigoureuses, donnant une de l'île de Vancouver, de 0.25 à 0.50 de longueur, grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs.

Tige de 0.50-0.70; les brins de 0.20, rigides, souvent indurés au sommet, d'un beau vert, grappes longues de 0.25-0.50, formées d'un très-grand nombre de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs, avec le lobe d'un pourpre uniforme. Fleurs de mai à juin.

Variété : — *Intermedia*, de Moravia, semblable de part, avec à l'île de Vancouver, de 0.25 à 0.50 de longueur, grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs, avec le lobe d'un pourpre uniforme. Fleurs de mai à juin.

— *Intermedia*, de Moravia, semblable de part, avec à l'île de Vancouver, de 0.25 à 0.50 de longueur, grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs, avec le lobe d'un pourpre uniforme. Fleurs de mai à juin.

R. vancouveriense (plante). Lill.

Introduite de Jers, vers 1860, cette espèce est voisine de celle que le *R. vancouveriense*, avec lequel elle a beaucoup de ressemblance. C'est également une plante peu élevée, à tige droite, garnie de feuilles très-nervées, rigides, d'un beau vert, de 0.20-0.25 de longueur, linéaires au sommet; racines un peu pendules et un peu moins longues que les feuilles; fleurs nombreuses, d'un rouge vermillon vif saillant sur les divisions et jaunes sur le lobe. Fleurs en mai-juin.

Variété : — *Intermedia*, de Moravia, semblable de part, avec à l'île de Vancouver, de 0.25 à 0.50 de longueur, grappes de fleurs à divisions jaunes, marquées de points pourpres vifs, avec le lobe d'un pourpre uniforme. Fleurs de mai à juin.

R. vancouveriense (à l'île de Vancouver). Lill.

Cette belle plante, introduite de Jers, vers 1860, est voisine de celle que le *R. vancouveriense*, avec lequel elle a beaucoup de ressemblance. C'est également une plante peu élevée, à tige droite, garnie de feuilles très-nervées, rigides, d'un beau vert, de 0.20-0.25 de longueur, linéaires au sommet; racines un peu pendules et un peu moins longues que les feuilles; fleurs nombreuses, d'un rouge vermillon vif saillant sur les divisions et jaunes sur le lobe. Fleurs en mai-juin.

abundantes, le Malabar, est voisine de *S. patersoni*. Vigneuse et florifère comme on dit, mais les fleurs complètes en sont très rares.

Type exalta, robusta, garnie de feuilles lisses, charnues, souvent déclinées, comme coriées, d'un vert intense; grappe cylindrique de plus de 0.20 de longueur, composée de fleurs serrées d'un blanc de neige, charnues de points fins, avec une labelle presque latérale. Fleurs en mai-juin et se succédant très souvent.

S. rotundum (Jussieu). Hort. Fl. XIV, p. 1443.

Répété comme une variété de *S. patersoni* par Lindley, et à *S. rubrum* par Robinson. Originale de Java.

Plante vigoureuse et florifère, de culture facile, elle ressemble par son port et son feuillage au *S. rubrum*, ayant comme lui les feuilles d'un vert intense; grappe de fleurs vert noir. Les corolles cylindriques, longe de 0.20-0.40 les fleurs, ont les deux du blanc de rose, marquées de rose pourpre, avec la labelle grande et latérale de la couleur des mandes. Outre sa vigueur, on croit que c'est la plus précieuse pour la floraison, qui arrive d'oct à juin, avec une durée de trois semaines et une rare abondance.

S. rubrum (à fleurs rouges). Lill.

Trois fois répété de Népaul, à feuilles arquées, lisses et comme d'un vert foncé et tendues de brun rougeâtre; grappe dressée de nombreuses fleurs d'un rose vil.

S. violaceum (Jussieu). Boiss. D'abord, pale:

Sp. : *Elaphoglossa violacea*. Boiss.

Peu se répète des Maldives, croissant sur les branches et dans les creux des arbres élevés et à l'air des îles de l'Inde, dit M. Perce, prenant la position horizontale mais que les fleurs, et leurs mandes sont aussi moins abondantes. Le supporté sous la charnue, qui dure plusieurs mois sans la floraison et en les fleurs. Température de 20 à 30°.

Type robuste, garnie de feuilles de 0.20-40 de long et large, lisses, charnues, très légèrement ondulées et dentées et serrées, d'un vert foncé; grappe de fleurs charnues et

garnie de feuilles et très serrées. Mandes de mandes en fleurs d'un blanc d'ivoire pointées de blanc, avec une large bande violette sur le bord de chaque pétale; labelle comme d'abord, repé de blanc. Fleurs très abondamment de fleurs à sept et se succèdent pendant de deux mois dans sa floraison splendide.

SCHOMBURKIA. Lindley. *Asplenium*.

Plantes épiphytes, répandues dans l'Amérique tropicale, depuis la Caroline jusqu'à l'Inde. Indivisiblement, à 10-15 centimètres, et, et à 10-15 centimètres; corolles, robustes, pointées; les mandes plusieurs. Fleurs robustes, avec des grappes; grappe robuste, atteignant chez quelques espèces jusqu'à 10 centimètres à trois mètres, terminée par une protuberance charnue à divisions dentées et à labelle trilobé.

Ce genre est maintenant réuni avec *Stictis* par le docteur Robinson (1).

typique.

Plante en pots ou panier, ornée d'un mélange de corolles de terre charnue, de gros fragments de charbon et de sphériques ou les plantes en bord, dans le coup n° 2.

Remarque d'une sur toute la plante pendant la végétation, en dehors les jeunes pousses; par un point en terre, souvent dans plusieurs à ce moment de 10 à 150. Fleurs le plus souvent de corolles avec un peu plus de mande dans les mandes de pointées.

St. crispata (à fleurs orangées). Lill.

En l'Inde, les fleurs de 0.20 de longueur, cylindriques, affaiblies, marquées de blanc à trois feuilles lisses, robustes, ondulées, sans la fleur; corolles de plus de 10 centimètres de

(1) Vale à ce sujet le docteur Robinson en M. L. V. Boiss. Fl. Ind. 1847.

haut, portant au sommet une panicule de fleurs à divisions les jumeaux, à lobes blanc strié de bleu et bordé de jaune avec l'intérieur blanc.

No. Lycual. Lili. Pl. KK. pl. 3333.

Introduit des montagnes de Sainte-Anne, Jamaïque, par M. Lyons.

Paniculées de 0.30 de haut; du sommet part un cône à peu d'un mètre de longueur, terminé par une panicule de fleurs entièrement blanches, avec des pétales de pourpre en intérieur plus ou moins étendus, et au lobes bordé de jaune; toutes les fleurs cylindro-striées sur les bords.

No. Alacrisia (trompette). Lili. Pl. 1. page 371.

Trois-accrément commun et ainsi nommé parce que les fleurs de l'homme en dépassent les palattes en trompette.

Panicules de 0.40 à 70 de longueur, en forme de cornes effilées, striées, interrompues par des anneaux étranglés, au sommet, d'un vert jaunâtre, et avec au périclète des fleurs à l'extrémité. Feuilles au nombre de deux ou trois, ovales oblongues, épaisses, d'un bout court; cône terminal de 0.5 mètres, mais à 1.00 au plus dans les autres, dressé, cylindrique; deux nervures d'un bout et de l'autre, au moyen de 0.005 de diamètre, à divisions cylindro-striées en largeur, d'un bout latéral, dressé, conchoidal de haut en dehors, et en dedans avec l'axe vers le haut; puis jusqu'au sommet d'une tige conique élargie; les sépales ont au sommet externe une nervure verte. Le lobes, très ample, strié, est blanc avec crème, strié de rouge, au bord bordé et strié de violet et le centre du lobe avec l'axe de jaune. Fleurs au bout de la tige.

No. undulata (ondulée). Lili. Penn. 32.

Découvert en 1841 au Venezuela par Linden, sur les rochers arides de Trucillo, et introduit par lui en Europe.

Panicules très-fines, de 0.05-0.70 de haut, effilées, terminées par 20 à 30 fleurs oblongues, striées aux deux bouts; cône de 0.5 et plus de haut, terminé par un racème ou corymbe de 0.4 dans l'axe jusqu'à cinq-cinq à l'épave; à divisions striées

d'anneaux striés distincts, fortement endurcis, les corolles au sommet d'un pourpre foncé à reflets métalliques; lobes striés sur les lobes latéraux, rose vif sur le lobes, strié et bordé sur les bords.

SCUTICARIA. Lili. *Spideberry*.

Petit genre de plantes de l'Amérique septentrionale, comprenant quelques espèces plus communes que toutes, comme la *Spideberry* longue, cylindrique, rappelle celle des *Scuticaria*. C'est très-rare; les fleurs sont portées sur des tiges très-courtes au bout de la base des feuilles.

Culture des Scuticaria.

No. Delogoni. Lili.

Les rayons; feuilles cylindriques de 0.25-0.5 de longueur, d'un bout foncé; cône court, terminé par deux fleurs à lobes très-clair au sommet. Deux lobes plus longs vers le bas et striés de jaune clair; lobes blanc, vif de rose tendre et le jaune.

No. Hadwest (pour *Spideberry*).

No. Steadi. Lili.

Des racines tendres. Feuilles cylindriques pendantes d'un bout vers le plus d'un mètre de longueur et terminées en pointe effilée. Les fleurs partent du bas de la tige et ont d'un bout crème strié de rose, l'autre strié de violet et l'axe strié de rose, avec une très-longue durée.

Les plantes, dont le plus grand nombre de fleurs à l'épave, sont très-fines et striées sur un lobes de rose strié de violet et rose.

avant de se crever pourpre, réfléchi plus foncé et enfin de rouille avec la marge de son reversure (noir). Fleurs de février à mai, en comp' n° 2, avec une durée de plusieurs semaines.

Variété. — *variosa*. Achet connue sous ce surnom par ses, la tige glabre des fleurs d'est d'un jaune pâle, dépourvu de vives colorations du type; observation que me faisait M. A. H. réitérant que j'examinais la magnifique exemplaire en fleur de sa serre du Luxembourg.

8. *Dendroica*. Hybride anglais.

Cette plante, un des beaux palmes de M. Dourley, dont il parle dans titres le mien, provient du croisement des *S. Persei* et *cardinalis*, et tient des deux parents. Il produit deux fleurs à la fois sur chaque tige, se rapprochant par la couleur du *cardinalis* et pour la forme du *Persei*, avec toutefois une dimension un peu faible.

9. *longistylus* (à longue style). Reich. et Wern.

Curieuse espèce, provenant de Costa-Rica, découverte par Wimmer et importée probablement par lui, produisant de belles fleurs vert intenses, allongées en forme de cornues le soir, long de près d'un mètre, porte de nombreuses fleurs qui s'épanouissent les unes après les autres, d'abord capricieuses, puis régulières, bordé de blanc; l'inflorescence plus large; pétale simple, allongé en queue, d'un vert sombre, bordé de blanc et blanc à l'intérieur; lobes d'une forme curieuse, vert comme le bouton. Fleurs de décembre à mars, en comp' n° 2.

10. *Persei*. Reich. Fl. XVI, pl. 1618.

Toute cette espèce découverte en Pérou il y a quelques années par Pérou, collectionneur de la maison Velez, à une altitude assez élevée.

M. Hueton l'a déterminé sous le nom de *cardinalis*, tandis que M. Reichschach considérait qu'il forme une espèce à part, disant pour raison que ce dernier est une plante à corolles parfaitement unipennées, à rejet stérile, comme les très jeunes des autres et ne s'élevant pas de l'axe; mais, originaire de la Bolivie; mais

que le *Persei* croît en Pérou, produit des rejet stériles plus ou moins allongés, servant à la multiplication des autres glabres et aux palissades, comme le *cardinalis*.

Plante rampant; feuilles tétrastiches, graduellement bipinnatifides, ovales, cordées, subciliées, de 0,50 de longueur; nerv. 1-2-3-4-5, au centre des feuilles, bordées par les nerv. de 4-5-6-7, petites pour la part, jaunes verdâtres tout de suite après les premières, la longueur d'après vers et base, puis les nerv. et les autres sur les bords; l'inflorescence plus large et plus courte, moitié de fleur en bouton et dépassant moitié; pétale linéaire, effilé, bordé de blanc, de près de 0,10 de longueur et d'épaisseur vers le milieu, à base verdâtre et blanc tout vers le milieu; lobes bien conformés comme un cœur, jaunes verdâtres, angles bordés de vert, avec un intérieur blanc pourvu de poils. Fleurs en mai-juin, en comp' n° 2, 17 groupe.

11. *Reichschach*. Fl. XVI, pl. 1618.

de base tétrastiche à été découverte en 1871, par M. Reichschach, collectionneur, sur les bords du Rio-Sagua, Nord-Est, mais, sur la versant ouest de la Cordillère centrale.

Plante caulescente, de 0,10 à 0,20 de hauteur, à base contractante des feuilles; celles-ci, de 0,10 à 0,15 de longueur, larges et d'un vert tendre, sont striées, lisses, et bordées au sommet, comprimées et cordées à la base, puis effilées vers le milieu; nerv. 1-2-3-4-5, au centre des feuilles, bordées par les nerv. de 4-5-6-7, petites pour la part, jaunes verdâtres tout de suite après les premières, la longueur d'après vers et base, puis les nerv. et les autres sur les bords; l'inflorescence plus large et plus courte, moitié de fleur en bouton et dépassant moitié; pétale linéaire, effilé, bordé de blanc, de près de 0,10 de longueur et d'épaisseur vers le milieu, à base verdâtre et blanc tout vers le milieu; lobes bien conformés comme un cœur, jaunes verdâtres, angles bordés de vert, avec un intérieur blanc pourvu de poils. Fleurs en mai-juin, en comp' n° 2, 17 groupe.

Plante caulescente, à base contractante des feuilles; celles-ci, de 0,10 à 0,15 de longueur, larges et d'un vert tendre, sont striées, lisses, et bordées au sommet, comprimées et cordées à la base, puis effilées vers le milieu; nerv. 1-2-3-4-5, au centre des feuilles, bordées par les nerv. de 4-5-6-7, petites pour la part, jaunes verdâtres tout de suite après les premières, la longueur d'après vers et base, puis les nerv. et les autres sur les bords; l'inflorescence plus large et plus courte, moitié de fleur en bouton et dépassant moitié; pétale linéaire, effilé, bordé de blanc, de près de 0,10 de longueur et d'épaisseur vers le milieu, à base verdâtre et blanc tout vers le milieu; lobes bien conformés comme un cœur, jaunes verdâtres, angles bordés de vert, avec un intérieur blanc pourvu de poils. Fleurs en mai-juin, en comp' n° 2, 17 groupe.

8. Sublimi. Reich. *Pars.* pl. 34. Pl. XVIII, pl. 1017.

Découvert par Soliman, en 1830, à une altitude de 3,000, dans les montagnes d'Ormus, Nouvelle-Hollande, dans des lieux humides.

Ce *Scabellia* est complètement différent de toutes les espèces jusqu'ici introduites par la confirmation de ses fleurs. Tige de 8. Dicotylédone, ses racines très-fines, d'un vert jaunâtre, à feuilles distiques de 0.20 de long, coriaces, légèrement ruguleuses et canaliculées, à nerv. vert clair. De leur aisselle partent, sort un scape terminal, d'un vert jaunâtre, d'environ 0.30 de haut, portant quatre à six fleurs ordinairement dans une racine, mais allant jusqu'à dix-huit dans ses pays nataux, porte pour la partie, n'ayant que 0.05 de diamètre. Les sépales en sont presque ronds, coriaces, canaliculés sur les bords, d'un blanc verdâtre et veinés à l'intérieur. Les pétales plus grands, triangulaires, d'un blanc pur, légèrement bordés de jaune verdâtre, sont traversés au centre par une ligne verte et blanche de rose rosé et portent plus d'une rose dans leur insertion. Le lobule, ressemblant à la brève triloculaire d'une Calceolaire, est blanc par ses bords et tout de rose foncé vers son centre, avec une ouverture droite et contracte, pointée en charge de petites bandes concentriques jaunes pourprées sur un fond circulaire blanc. Ces fleurs blanches, à coloris de violâtre, se succèdent de novembre à avril, en bouquet.

Variété. — *obliquum*. Pl. XXI, pl. 181.

Tige plus corollée à fleurs complètement d'un blanc pur n'ayant que quelques petites arêtes d'un pourpre carminé vers le charge de l'ouverture contractile du lobule. Nous l'avons obtenue et fleurir sur un exemplaire exotique, dans les serres de M. Linden, en février 1855. Elle provient de la Cordillère occidentale de la Colombie, en chef de San-Miguelito, et se distingue de la variété locale des *Calceolarias*, tandis que le type exige plus de chaleur.

CULTURE.

Les exemplaires que nous avons vus, vus à Paris, soit à l'été, soit plus tard en juin, dans des terre humides et compactes, sur un bon drainage, qu'on arrosait très-abondamment pendant le travail de la plante et qu'on modère de novembre à janvier, pour la laisser reposer. La première se reproduit sur les racines des mû-

res qui, dans leur abaissement à l'époque des pluies, tombent dans et le courent de vers, et dont les deux dans leurs racines seules trouvent dans l'atmosphère une nourriture peu prise sous terre, grâce l'année, qu'on donne leur présence dans la terre.

9. alatum (de Bonpland). Reich. Pl. XXIII, pl. 336.

Appartient au Reich, province de Rio-Janeiro, chez M. Bonpland, Angletier.

Tige de 8. Corollée, avec les feuilles supérieures d'un vert jaunâtre, racines robustes, armées, glabres, sépales dentés alongés, bords vert tendre, rayés par des nervures pourprées; l'intérieur beaucoup plus grand, blanc verdâtre; pétales linéaires, pointés, bordés sur les bords, qui sont ainsi que les lobes supérieurs d'un rouge pourpré, tandis que le centre de leur base porte le lobule de sépale dorsal. Le lobule petit est d'un vert bruni à l'intérieur et blanc verdâtre au-delà de petites pourpres en dedans.

NOTES. — Reich. *Pars.* *Arborea*.

Plantes terrestres américaines, habitant presque toutes les hautes montagnes situées sous l'équateur et entre les tropiques, mais dans les régions tempérées, et elles croissent à des vents remarquables par leurs tiges dressées, arborescentes, par les articulations, rapprochées en toutes espèces, quelquefois canaliculées, garnies dans toute leur longueur de feuilles linéaires étroites, nervées glabres, coriaces et longuement exsertues; leurs très-grandes, corollées ou linéaires plusieurs autres pédoncules sortant du sommet des tiges; calice jusqu'à présent chez une seule espèce, le *S. dichotoma*; 5 sépales étroits, canaliculés sur leur base, linéaires; 5 pétales plus larges, canaliculés; lobule très-grand, canaliculé en avant et à l'arrière d'un côté, canaliculé et creux sur un bord.

On connaît une vingtaine de *Scabellia*, dont le plus grand sort de l'écorce triloculaire et encore peu abondante de nos lieux de plantes le premier ordre et remarquable par sa port élargie de

(*Chlorandra juncea*). *Scleroda chlorandra*, *Cyrtopogon* (P.) etc. comme indication l'un ou l'autre des espèces, surtout de trois, pourrais et devraient. Avec ces données, il est évident que le traitement des autres espèces de *Scleroda* ne peut lui servir, mais bien celui des *Cyrtopogon*, avec lesquels elle croît à l'état spontané et en comp¹ n° 1.

So. aurea (juine aigre). Reich.

De Pérou, et du Chili croît par l'Épée, et Reil. Tiges grises, flexibles, garnies de bractées engainantes velues au touché, garnies de quelques feuilles, seulement vers leur partie supérieure forment un groupe terminal, au nombre de trois ou quatre, tripartites, à divisions linéaires; la base oblong, crispé, le bout d'un jeune arbuste. Comp¹ n° 2.

So. decora (belle). Bate.

De l'Amérique. Fleurs solitaires penchées, de 0,01 de large, d'un blanc rose passant au blanc et se corollant fort longtemps. Les pétales des feuilles et les bractées sont couvertes de papilles blanches. Comp¹ n° 2.

So. dichotoma (dichotome). B. et Pav.

Découverte au Pérou par Bate et Pavon; trouvée également dans la Nouvelle-Grenade, par Linden, Panch et Solís, vers 2,000' d'altitude.

Cette magnifique espèce, connue au Pérou sous le nom de *So. del Paraíso*, de la beauté et du parfum exquis de ses fleurs se distingue par ses tiges glabres qui s'élevaient jusqu'à six mètres et dépassant les autres à l'apogée et se terminent par elles sont terminales. Elles sont garnies de feuilles ovales, longuement acuminées; grappes ciliolées, blanches, formées d'un grand nombre de fleurs, larges de 0,07-8, blanches au dehors, violet pourpre au dedans, d'une texture très-épaisse. Fleurs en janvier-juin, comp¹ n° 3.

(1) M. Walla-Pala de Bate, le genre des *Cyrtopogon* disparaitrait sans doute.

So. fragrans (parfume). B.

Trouvée par Panch et Solís, dans la Nouvelle-Grenade, vers 2,000'; dans le genre de *So. chlorandra*, à grandes fleurs rose, tri-partitides. Fleurs solitaires, en comp¹ n° 2.

So. latinea (à grand feuille). Reich.

Chili. Pérou. Trouvée par Wimmerer; port relevé de *So. chlorandra*; feuilles étalées dans l'épiphyse, à nervures latérales; fleurs rose pourpre, d'une délicate corolle de long et presque aussi grandes que celles de *maracantha*. Fleurs en 0,0, en compartiment n° 2.

So. lilasstrum (à fleurs de lilas). Leil.

Épée et Reil. Chili, dans la province de Talca, dans les bords du Chili, et bords du nord de l'Oréon, et au Pérou, vers le sommet nord de la Sierra de la Campana, à une altitude de 600 mètres.

Tiges de trois à quatre mètres de hauteur; feuilles linéaires très-étalées, ovales ainsi que les pétioles; fleurs en grappe terminales, au nombre de trois à quatre centes, pendantes et de 0,01 de large, corolles blanches, tendres roses, au bout les corolles, à la base se convertit à l'extrémité, en l'extrémité, en la base et toujours de la couleur différente des pièces de pétioles; rose pour les blanches et jaunes d'or pour les roses.

Cette espèce se distingue plus de hauteur que les autres; on la trouve toute l'année dans le comp¹ n° 1, où elle fleurit en juillet à août.

So. Lindleyana. Reich.

Chili. Autre découverte de Wimmerer. Plante haute pour le genre, atteignant au moins 80. métrologie. Feuilles ovales et rudes; fleurs grandes, blanches, terminales et solitaires, à la base jaune orangé, passant de rose. Fleurs en juillet-août, en comp¹ n° 2.

So. maracantha (à grandes fleurs). Leil. et Pav.

Originairement découverte par Bate et Pavon, cette admirable espèce se rencontre au Mexique et au Guatemala. Elle fut en-

allongées, ovaires, charnues. Les fleurs, généralement solitaires, petites ou moyennes, ont les divisions presque égales, ovales, libres et imbriquées, elliptiques, arrondies. Le tube petit, sessile et flagelliforme, a sa base recouverte avec le pappus, qu'il enveloppe de ses lobes latéraux réunis au sommet, tandis que le médian est plus, lâchement sépié et projeté en avant.

ovaire.

Ces plantes montagnardes, produisant presque toutes, excepté la *S. cornuta*, de longues tiges hautes et où la graine se fait sentir, sont de culture facile, si on les tient séchées et polymères des charbons concentrées de son côté, qu'elles ne peuvent supporter impunément; elles sont donc parties du contingent de compostement n° 3, allié aux *Chlorophytum*. Placées au milieu ou installées sur un point, au sommet d'un petit massif, ou, formé avec des matériaux artificiels, on leur donne un petit ventricule, mais près du jour et judicieusement ventilé. Malheureusement le compost humide par de fréquents et légers arrosages en été; les vents plus déchaînés, avec une température de 8 à 10 degrés en hiver. Après du repos, voilà, en quelques lignes, les soins qu'il faut réserver et qu'il faut vous payer largement par leur longue et abondante floraison pendant les six années de l'hiver.

3. *cornuta* (pendante). Lf.

Voilà encore les traces des grands arbres, dans la forêt éparse et humide de la province de Salin, au Brésil.

Petite plante, dont le rhizome rampant se bifurque en ses sens et about dans toutes ses parties de prolongement et de chaque côté, d'une façon distincte, alternes et serrés, de minuscules petits poils, comme des arêtes d'osier, un peu comprimés (serrés) et, d'un vert grisâtre; feuilles terminales petites, de 0,04 de longueur, un peu arrondies, élevées à plat sur le côté d'un vert dense orné de brins poireux sur la bordure, recouvertes de la base au sommet par une bande de même couleur, avec l'arête marquée et pointée de même. Branches filiformes très-courtes, sur les bords de l'aisselle, dressés, portant deux ou trois petites fleurs, à divisions peu étalées, d'un rouge rosé.

plus, avec le lobule très-petit, marqué de jaune sur le dos. Florit avec une odeur abondante de Noli à l'hiver, avec une odeur longue d'arête, en coup n° 1 et 2 (sèche).

4. *cornuta* (horizontale). Br. Br. Pl. XVII, pl. 1211.

Sp. : *Chlorophytum*. Lf.

C'est l'espèce à plus grande fleur et les plus déboussés, mais, qu'il ne faut pas confondre avec les autres espèces par tout le nom de *S. grandiflora*, Lf., noté par le n° 4 de l'espèce *S. cornuta*, pour éviter à l'avenir toute confusion.

Elle est en question et est généralement désignée par les auteurs, sur les hautes montagnes, entre les districts de l'ouest et d'El Estero Grande, mais elle se fait introduire par le Brésil, qui la possède dans les montagnes des Capes et l'ouest de l'Angleterre. Elle se trouve, dit M. Paris, sur les montagnes les plus hautes des provinces de Rio Grande et de Bahia. Elle se distingue sur de petits arbrons, dans les hautes régions presque toujours de l'ouest et où la graine polymère pendant l'hiver, avec une température de 8 à 10°.

Les feuilles elliptiques-ovales, arrondies aux deux bouts, plus longues que les feuilles et flagelliformes, de 0,04 de longueur, d'un vert intense, polymères (serrés) terminales, fleur solitaire, de 0,06-1 de diamètre, d'un côté pour l'espèce, quelques-uns après de l'autre d'une façon plus dense. Le lobule, de même couleur, présente sur les deux lobes latéraux près de petites arêtes pointues. Elle recouvre les feuilles de l'ouest à l'hiver, pendant plus de six années.

5. *multiflora* (craque d'un ruban arête). Br. Br.

Sp. : *S. grandiflora*.

Cette espèce, en vertu de la polymère, produit des rubans tendres et se distingue en vertu de la graine, présente, et, d'un côté pour l'espèce, dans les montagnes d'El Estero Grande, elle se distingue par les petites fleurs, avec, par des feuilles moins longues et plus serrées, et des bords d'une couleur plus dense. En somme, des questions à peu près, qu'il faut les voir toutes dans les montagnes pour faire la coupe.

par de folioles linéaires, à les malaxer pendant tout le temps de la végétation dans une humidité convenable et en évitant de mouiller les jeunes pousses, dont la feuille tendre ou coriace vient les tuer ou les expose à la décomposition. A cet état de chose, doit se joindre une chaleur sèche et constante, variant entre 20 et 30°.

A partir du parfait développement et des feuilles et de leurs feuilles, on commence à récolter les racines pour les suspendre commodément pendant tout l'hiver et les tenir à l'obscurité, dans un lieu où la température oscille entre 4 et 10°, par exemple; on repose long et bien secoué en indispensable pour les faire pousser régulièrement et les amener à fleurir. Toutes racines en végétation, il ne fleurissent pas.

Ces plantes, produisant une grande quantité de racines, ont bientôt formé dans les matras ou plantations un réseau impénétrable aux simples flammes ou est fond de les transporter dans les quatre à cinq ans et de leur récolter une partie de ce réseau, en commercial par toutes qui est gris. Cette opération doit se faire dès que la plante commence à se mettre au travail. La seule qu'elle se ignore l'importance de fleurir cette même année; mais les excès trop abondants de racines de force que les autres. Les racines d'un ouvrage leur donnent une grande rigueur.

Les espèces en végétation de *Scoroparia* communes et intéressées sont très nombreuses, mais comme leurs fleurs sont toutes utilisées et par conséquent décolorées, nous en passons et nous les plus médicinales.

St. aurea (Linné). Lili.

En *Quadrifida*. De toutes assez gros; feuilles grandes et larges, d'un vert tendre et luisant; fleurs très odorantes, en nombre de 4 à 12 par racine, dans la partie de 8; pédoncules, seuls très gracieux, d'un jaune clair, autour de points pourpre noir ou jaune du genre à l'intérieur, avec le nez de la fleur. (Un orangé tendre).

Fleurit en avril en abondance, en camp n° 2.

St. Anaphalid (Macbride). Lili.

Découverte en 1804, dans les montagnes de la république de

l'Égypte; par Macbride et Macbride; récoltés plus tard aux mêmes endroits par Hartweg, et enfin par Ponce dans les provinces de Caracas et de Cumana, en Vénézuëla; cette belle espèce a des racines petites, à racines verticales; les fleurs récoltés à la base ou au long pétiole, peu pétiole et longues de 0.25-30. Stems produisant d'ordinaire deux, donnant du à neuf fleurs; pédoncules courts, d'un blanc jaune orangé, comme généralement de grandes taches et de points pourpres sur les bractées; la fleur très odorante de l'étoile. D'abord orangé, puis d'un jaune d'or intense, pendant le temps ainsi vers son ouverture. Fleurit en août. Camp n° 2.

variété: — *patens* (Macbride). De Pérou, vers 1800; fleurit, à fleurs jaunes blanches, membrane de leur corolle. Camp n° 2.

St. circinata à longue corolle. Lili.

De Nicaragua. Dans le pays de St. Charles, à Santa Rita; les racines de quelques taches brunes, dont la fleur est ainsi de deux longues corolles en étoile. Camp n° 2.

St. Devesiana (du bar de Devesiana). Lili. Pl. 3, pl. 112.

Origine incertaine, probablement de Pérou d'après Linné. Petioles robustes, cylindriques, généralement corallins; feuille corallins, pétiole, large, ovales de 0.25-0.50 de longueur, d'un vert très clair; racines pendantes, parfois deux ou trois fleurs de 0.15 de longueur, très courtes, roses; corolles, à sépales bordés jaunes marqués de taches transparentes vers la base et de macules brunes ou rouges, très courtes; pédoncules d'un jaune plus large, variés régulièrement à leur base et maculés au sommet, de la même couleur que les sépales; fleurs nombreuses, dont la base apophyse est souvent émise, marquée de taches roses; les racines et la base médiane jointes ensemble, 100° de courbure, ainsi que le gynécium.

Fleurit en juillet-août, en camp n° 2.

St. charnosa (Macbride). Lili. Pl. XIV, pl. 120.

Découverte au premier lieu dans les forêts des montagnes des Andes, près de Rio-Chiriqui, elle fut ensuite récoltée dans les

Oxyptera et le *Vindula* h. Quelques introduites depuis 1858, avec belle espèce au même rare et au même caractère que le *St. grandiflora*.

Po-hétes très-petites, de 0,07 de hauteur et fortement allongées; feuilles assez longuement pétiolées, très-pétioles, de 0,25 de longueur, d'un vert blancâtre, assez courts, garni de deux fleurs chacune, larges de 0,12. d'un blanc d'ivoire et d'un blanc pédonculé. Fleurs en 24, en compart. n° 2.

83. cocconia (cocconia). Ldl. Pl. II, pl. 8, 12. Inconnue.

Introduit par Wimmerman de l'Amérique centrale à l'Alcalá de San Juan, où il a fleuri pour la première fois en 1855.

Po-hétes et feuilles semblables aux précédentes; assez hautes; fleurs très-amples, à peu près incolores, blanches sur les divisions externes et marquées de quelques fleurs pourpres sur les divisions internes; pétales blancs; feuilles et fleurs d'un Oxyptère, très-courts et dépourvus de cornes, d'un bel orangé doré sur les fleurs, passant au blanc par un moment, et passant de pourpre vers le blanc. Fleurs en 24, en compart. n° 2.

84. grandiflora (à grandes fleurs). Ldl.

Des Antilles. Très-très-petites. Dans le genre de *St. coccinea*; mais à po-hétes plus fortes et feuilles plus grandes; fleurs atteignant 0,15 de diamètre, très-décolorées, sur un vert très-vert, d'un blanc pur, avec des pointillures orangées pourpres sur la partie inférieure de la corolle. Fleurs à diverses époques, en compart. n° 1.

85. graveolens (à odeur forte). Ldl. Pl. II, vol. 1, pl. 1.

Origine au Pérou et au Guatemala. Petiolules très-graves et feuilles les plus grandes du genre; assez courts, portant deux à six fleurs très-amples, atteignant une fleur et pétiole qu'elle en devient saupente; pétales blancs et blancs horizontalement; pétales plus étroits, recouverts sur les bords, recouverts par dessous le pétiole inférieur; avec d'un jaune tendre, avec une teinte d'orangé sur leurs bords; feuilles d'une forme ovale, jaunes et recouverts sur la partie supérieure et blanche de sa base, avec une bande pourpre noir de chaque côté; les deux grandes cornes de son milieu ont

d'un blanc d'ivoire blanc, ainsi que le pétiole inférieur qui est un autre, fortement pourpre de chaque. Fleurs en 24, en compart. n° 2.

86. incana (incana). Ldl.

Des Antilles. Fleurs hautes et peu hautes, à divisions jaunes pâles, avec la corolle blanc pur, coloré en jaune doré à la base.

87. incana (incana). Ldl.

Des Antilles. Très-petites espèces à pétales jaunes pâles, recouverts de rouge pourpre; pétales blancs de même fond, mais recouverts de blanc; feuilles fortement recouverts à sa base en forme de rose, blanc avec une bande de rouge orangé. Fleurs en 24, en compart. n° 2.

88. Martiana (de Martiana). Ldl.

Des Antilles. Une des plus belles espèces, dont la hauteur passe de trois à six fleurs, larges de 0,15, à quelques fleurs pâles, légèrement et par places marquées d'un rose de petite pointe rouge violacé; pétales d'un blanc incana, avec de larges bandes orangées roses et bords de rose pâle à la base; feuilles d'un blanc d'ivoire, un peu rose vers la base, assez très-courts, d'un blanc des troupes d'éléphants, avec les nervures en petit cartilage; caractère individuel. Fleurs en 24, en compart. n° 2.

Variété : — *decora*. Ldl. Différence à fleurs très-grandes, colorées, d'un blanc pur, fortement marquées de rose.

89. variata (sans des parts). Ldl.

Des Antilles. Fleurs jaunes d'ivoire, avec des points de petites nervures pourpres violacé, en forme d'ovaire, recouverts sur les nervures, clair-rose sur les points; la corolle porte une bande blanche de son recouvrement une bande blanche pourpre, recouverts à sa base. Fleurs très-décolorées de blanc, à nervures, en compart. n° 2.

Existe dans les cultures de commerce et dans les jardins de cette espèce.

H.L. Martínez-Moreno², T. Díaz

Introduits du Mexique, avant 1890, par M. Lecoq, cette espèce est la plus abondante collectée du genre, à nos paléons typiques. Les deux impressions irrégulières, la longue partie latérale à cinq lobes de 0,66 à 1,8 de large, dont les segments les plus larges sont convexes, car au fond jaunissent, de longues ongles irrégulières rouge orangé boudant, allongées transversalement vers la base des pièces et arrondies vers le sommet, indiquent la base et le sommet d'une. Le labellé, jaune d'or à la base, largement évasé de base rouge velouté, au sommet plus ou moins, car les cornes et le gynostème, et toutes ces dernières pièces et criblées de points courts et serrés. Ces belles fleurs, d'après moi très-rarement, se montrent du juillet à septembre, au sud-est de l'île N° 2.

Manuscript received 11 November 1997; accepted 11 November 1997.

Également de provenance mexicaine, cette belle variété se distingue de la précédente par une tige plutôt moins verte, à fond moins jaune, les macules plus larges, enfin par des fleurs plus roses, atteignant 0,20 à 24 de diamètre et agréablement

DOI: 10.1002/for

(b) *La Gueyra*, Caracas. Pe-bulbe très-grande, de 0,08 de long-ueur; profondément sillonnée; sur le latéro-cône piriforme, large, ovalaire, pendante; craps long, point de cinq à sept fleurs, distinctement odorantes. Deux jours d'un seul de petites taches bruns-rouges; labellés concaves, avec une large bande orange sur la partie visible de sa base. Comestible. $\pm$ S.

11. *Journal of the American Medical Association*, 277:1025-1026, 1996

STEIN, L. London.

[illegible]

Abstract

Les Nevada, dont trois espèces seulement sont communes en Europe, ne valent guère les *Diffusaevallia*, dans un pays où il y a une différence de sept cents heures de la durée de leur croissance. Placés en compagnie d'un ou deux autres *hemionus* d'été, de chèvres et de moutons d'hiver, ils produisent l'effet d'un contraste, pour lequel cela ne faut pas oublier les avantages de plantation dans un état voisin de la stérilité, jusqu'à la venue de la végétation.

8. *Strobilites* [a flower trumpet]. *Union et Rev.* 34, IV, 1871, p. 51.

Discutiert par Solheim, son introduction dans l'enseignement
Anders est due à Wallin, qui le rencontre dans le premier
offense (Nouvelle Courtoisie).

— *Amuse de petite taille, élégante, avec les hautes épaules appuies, dont les feuilles droites sont articulées sur des gaines droites, d'un vert plus gris; palmelles dressés, grêles, vertes et courtes; fleur de consistence membraneuse, à lobes étalés; pétioles étalés et frangés; hille très-grand, noir, dont le lobe médian est creux sur tout le pourtour d'une des frangements. Toute la fleur est d'un jaune assez tendre, le hille noir présente sur son contour latérale une série droites de petites nervures saillantes. Fruit, d'un gris violâtre.*

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–111

Introdução do *Diapermum* (Caryophyllales), por exemplo, ocorre apenas a
 10 km de distância da costa, com o mar de fundo.

THESIA, Reich. *Ardisiacea*.

Plantes semi-terrestres succulentes, renfermant un petit suc lactescent, souvent emmanché au et les *Phajus* (*Hylodendron*), ont le docteur Boissierbach a appelé le triage pour en former un genre *Thesia*. Quelque ayant à première vue quelques ressemblances avec ces derniers, ils s'en distinguent facilement par leurs tiges droites et cylindriques croissant au touffes, par les feuilles qui les garnissent dans toute leur longueur et en quelques à l'apex de la tige, et enfin par leurs grappes de fleurs, qui sont terminales et non latérales, comme chez les *Phajus*. Les fleurs ont beaucoup de ressemblances avec celles de nos derniers, mais la gynoécée en est ovale, aplatie et adhérent à la base du lobelle.

CROISS.

Les *Thesia* se plantent en pots remplis d'un compost formé de terre fibreuse, avec un tiers environ de sphagnum haché et de fragments de charbon, sur un bon drainage. Ils exigent beaucoup de chaleur pendant la végétation, aussi leur place est-elle dans le compartiment n° 1. Pour pousser vigoureusement et fleurir, ils exigent un repos bien marqué; on est prié de se rappeler que la chute des feuilles et on l'évite par un abaissement de température nocturne entre 50 et 15°, en par la suppression des arrosements, sans aller jusqu'à une sécheresse capable de faire mourir les plantes. Comme est d'un caractère très l'étranger, on a toute facilité de l'établir. Ils qui se révèlent un fait curieux à l'éclaircissement, on l'évite par la chaleur et en donnant un peu d'humidité aux racines, on les recouvre par le pied, comme on le fait pour les plantes bulbeuses du Cap, jusqu'à l'apparition des nouvelles tiges; alors les arrosements deviennent abondants, mais on ne discontinuera les arrosements sur le feuillage que quand l'eau prise avec de l'acétate pour s'en pas être enlevée.

Les fleurs se montrent sur les tiges nouvelles complètement seules; on n'est qu'après leur formation qu'on observe quelques plants à un développement progressif pour en assurer la maturité et solliciter la chute du feuillage.

Th. alba (Munz). Reich.

Sp. : *Phajus alba* L.f.

De nord du Brésil, Népaul, Bonaria.

Tiges cylindriques, de 0.20 à 0.40 de haut, revêtues dans toute leur longueur de feuilles coriaces, oblongues-lanceolées, aiguës, d'un vert glauque, venant 6, 12-20, distancées de grandeur de moitié à la base au point de s'élèver plus along de simples pinnules. Fleurs en racèmes terminaux, sur un court pédoncule. Les lobes de la corolle sont blancs; le lobelle légèrement blanc, mais coloré sur son centre de pourpre et de lilas.

Fleurit en juillet-août.

Th. Bonaria. Reich.

Découvert dans les montagnes de Bonaria, par le comte Bonaria.

Très-belle espèce, de plus récente introduction que la précédente, avec laquelle elle a de nombreux rapports de ressemblance comme port et habitus. Les feuilles en sont un peu plus longues, venant denses, un peu plus serrées par dessous. Les tiges de 0.10 à 0.20 de haut, en racèmes courts, ont les lobes de la corolle et les lobes de la corolle, d'un rouge pourpre distinct, devenant blanches vers la base. Le lobelle large et ouvert, est pourpre au sommet, blanc à la base, avec une bordure d'un bon jaune. Elle fleurit de Bonaria.

Th. straita (Munz de saige). Reich.

Des montagnes du Brésil. Cette espèce se rapproche plus de *Th. alba* que de *Bonaria*. Les tiges droites dépassent souvent 0.25 de hauteur; les feuilles longues d'un vert glauque, ont environ 0.15 de longueur; les fleurs en racèmes courts, au sommet du feu, sont d'un blanc pur.

Tr. albida (à fleurs blanches). Lill.

Trouvé par Wiedemann dans la province de Caracou, Bahia et feuilles d'un vert pâle; fleurs ordinairement au nombre de trois sur chaque pédoncule, à divisions blanches et lobes blancs lavés de jaune dans la gorge. Floraison en mai-juin.

Tr. caribaea (à fleurs blanches). Lill. Fl. XIV, p. 1490.

Découvert dans l'Amérique centrale par Wimmerow, qui l'a vu en 1841 en Angleterre.

Petiolules courts, lisses, d'un beau vert, ainsi que les feuilles. Fleurs de six à huit sur six pédoncules courts, grandes, toutes ordinairement d'un riche corail foncé, toutes terminées en lobes et branches en dehors, mais toujours marginales de blanc sur toutes les divisions; lobes en cornet largement écarté en queue grande lobe arrondi, lobes et cordons sur les bords, parties d'un corail pur râpé et ainsi plus foncé dans la gorge, ce lobe bordé d'un liseré blanc, mais toujours blanc sur tout son extérieur. Florit en mai-juin.

Tr. atrata (à fleurs orangées). Lill.

Redécouverte encore par Wimmerow dans les mêmes localités que la précédente espèce, dont elle n'est probablement qu'une variété locale. Ses petiolules sont un peu plus larges et ses corolles plus robustes. Les fleurs, ordinairement au nombre de deux et quelquefois trois, ont les divisions d'un beau rouge sang plus foncé que chez le *T. caribaea* et étroitement bordées de blanc. Le lobule d'une bristie un peu plus foncée, à son bord irrégulièrement mais fortement crépé. Florit d'avril à juin, avec une durée de quinze jours.

Variété : — *marginata*. Yucc. II. Fl. XVIII, p. 225.

Petiolules constamment plus courts; fleurs d'un rouge corail clair, largement bordés de blanc sur les divisions et étendant sur le lobule, qui est d'un corail foncé, cordé et dédoublé. Florit à divers époques, mais principalement en juin-juillet.

Tr. guianensis. A. Rich.

Syn. : — *plata* (partie). Ch. Lam. JR. VI, p. 225.

Trouvé en Guyane, province d'Orénoque, par Richard et Schlegel, puis introduit de Guyane, dans l'établissement Vénéloché, par Chabouley.

Cette espèce se distingue par ses lobes plus larges que chez les autres espèces et par ses feuilles longues comme celles du *T. caribaea*, d'un beau vert. La fleur est toujours solitaire, à divisions fin vert jaunâtre, relevées par une bande brune vers le long de la côte centrale; lobes d'un blanc crème, bordés de rose et dressés des trois côtés qui supportent les lobes et joint au centre. Floraison tardive, d'avril à septembre.

Tr. aurata (à color corail). Lill. Fl. VIII, p. 761.

Originale de l'Amérique centrale, cette espèce se fait à distinguer par ses petiolules d'ordinaire compacts, ou lobe arrondi, après de l'anthologie nous de l'anthologie nous, et par sa feuille largement élargie, cordée et étranglée à la base. Ses fleurs, dont l'odeur rappelle celle de l'orange, ont les plus grandes du genre et mesurent jusqu'à 6,11 de diamètre vertical; elles sont ordinairement au nombre de trois réunies en groupes retombants, à divisions d'un blanc crème, peu tendues et le lobule, fond jaune clair, bordé irrégulièrement de rose plus ou moins foncé, avec le centre rose d'une sorte transverse jaune d'or, accompagnée de quelques points de rose, en rose ouvert, blanc, crépé sur les bords. Florit en avril-mai.

Tr. tortilis (cordée). Lill.

Introduite des contrées de Nalapa, Mexique, vers 1834.

Petiolules élargies, feuilles légèrement ployés; leur corolles, cordées, larges de 0,00-0,01, à divisions roses, tendues de trois rangs, tendues en six-lobes; lobes blanchâtres, bordés de brun rouge. Florit à différentes époques.

Tr. Turneri.

Petiolules très pâles, courbés d'une feuille vert lisse. Chose autre profane ordinairement deux pédoncules de 0,20 de longueur, portant chacune deux fleurs à divisions blanches, avec le lobule blanchâtre de jaune.

de 0,05, dont les lobules, blanchâtres à l'extrémité, sont en latin, d'un vert jaunâtre, ornés de nombreux points rougeâtres; la lobelle, blanc à la base, se termine par un lobe large et oblong, d'un beau violet. Floraison axillaire.

Au premier aspect, on prendrait cette plante pour un *Epidendrum*.

V. Cartageni. Lili. Pl. V, pl. 187. — Pl. XII, pl. 1884.

Syn.: *Encyclia Cartageni*, Reiche.

Découvert en 1818 par M. Hochstett, dans les vallées chaudes de Saltille, Mexique oriental, entre 800 et 1,000^m d'altitude.

C'est une espèce vigoureuse, d'apparence grimpante, qui a l'apparence d'un *Brachyotum* canarien et peut atteindre de grandes dimensions. Les feuilles, de 0,40 de longueur sur environ 0,04 de large, sont un peu canaliculées, d'un vert pâle. Hange retombante, portant en racine de quatre à sept fleurs, charnues, de 0,008 de diamètre et espacées, dont les segments antérieurs et connues sont blancs au dehors et jaunâtres à l'intérieur de lignes transversales d'un rouge saumoné au dedans. La lobelle, très-charnue et veloutée, se blanchit à la base, avec ses cordes parcourues par deux lignes rouges saumon.

Floraison axillaire, en comp. n° 2.

V. carolinæ (Juss.) Griseb. et Reiche. Pl. VI, pl. 609. — Presl, pl. 28.

Découvert par Griseb., le long de la rivière Burapana, dans le district de Khayra, vers les frontières nord-est des possessions anglaises, appartenant aux Gerdauas, arctiques de la famille des Tibes et Cassidins, à une altitude de près de 1,000 mètres; mais ne fut introduit qu'en 1858 par Th. Lobb.

Tige d'un mètre et plus; feuilles longues de 0,12-14, dont le sommet tronqué, étalé d'un côté concave arrondi, l'autre de chaque côté une pointe aiguë; rachis dressé, dépassant le feuillage, formé de 9-12 fleurs, larges de 0,10-11, colorées en beau bleu d'azur, lobes supérieurs à trois, passant du blanc au bleu à l'extrémité; lobelle petit et poquet.

Floraison axillaire, en comp. n° 2.

V. carolinæ (Juss.) Griseb. et Reiche.

Jeune découverte de Griseb., en 1857, dans les forêts de la République; mais ne fut introduit qu'en 1857 par le colonel Deane, qui le ramena près de Mexico, d'environ 800 mètres d'altitude.

C'est tout à fait comparé à l'espèce précédente: les feuilles sont dressées, d'un vert charnu et blanches au sommet. Les languettes charnues portent de six à vingt fleurs charnues, rouge pâles, à lobes antérieurs plus ou moins, blanc au dehors; lobelle petit, d'un bleu pâle à la base et sur le dos, devenant plus pâle vers le sommet. Floraison axillaire à trois.

V. carolinæ (Juss.) Griseb. et Reiche.

Nord de l'Etat, Niguel, Saltille.

Tige courte; feuilles charnues, toujours d'un vert charnu, dressées au sommet; grappe dressée, plus courte que les feuilles, ne comprenant que trois à quatre fleurs, à lobes antérieurs blancs au dehors; lobelle large, veloutée, pointue et légèrement charnue de chaque côté sur un fond blanchâtre. Floraison axillaire à trois.

V. carolinæ (Juss.) Griseb. et Reiche. Pl. XII, pl. 1885.

Trouvée en 1860 dans les montagnes de l'Yucatan, découverte par le colonel Deane. Feuilles de 0,15-0,20 de longueur, plus ou moins, pointues au sommet, d'un vert charnu, blanches au dedans, long de 0,12, composé d'une demi-lanceolate à l'extrémité le sommet grand, d'un blanc à l'extrémité. Lobelle très-charnue, pointue au sommet, avec quelques lignes saumonées à la base et à l'extrémité, et quelques saumonées vers le sommet des lobes. Le lobe grand, très-velouté, porte vers la base une bande saumonée; jumeau à la base médiane, blanchâtre vers le sommet, se partageant en deux lobes charnues saumonées à la base et vers le sommet de chaque lobe. Floraison axillaire.

V. carolinæ (Juss.) Griseb. et Reiche. Pl. XII, pl. 1886.

Syn.: *Encyclia carolinæ* — Lili. (Juss.)

Trouvée par Griseb. dans les forêts, près de Mexico, d'environ 1,000 mètres; mais plus tard par le colonel Deane.

frange de Saugon à la milieu Yotich, probablement en même temps que le *V. canadense*, des mêmes localités, mais de nature latifolia.

Tige robuste, de deux doigts d'épaisseur, atteignant un long, helle, mais peu-toutement; racines adventives également très grosses et très-ramifiées; les lés profondément canaliculés, très-épais et charnus. Minuties d'épaulement, longues de 0,04-0,05 larges de 0,02, d'un vert intense. Sauges nombreux et étouffés, serrés par un long racine pendant et cylindrique, de près d'un demi-mètre, chargé d'innombrables fleurs serrées, couvrant à plusieurs minutes, monochlores de rose, avec trois ou quatre points pourpres vers la base des pétales; lobes d'un violet brillant. Ces racines comprennent, notamment odorante et de très-longue durée, se conservent en nature, dans le compart^o 2.

V. apiculata (apiculata). Lill. *AK* VIII, pl. 272.

Syn. : *Vaccinium apiculata* Reich (indistinctement).

Trigonale, ovale, serrée, en fleurs, le 1^{er} mars 1825, par Grille, près de Margot, en Allemagne.

Formes très-angues, très-angues, brèves et charnues, étouffés au sommet; racines deux fois long comme les feuilles, portant une dentelle de fleur de la division de celle du *V. distachyloïde*, d'un jaune plus foncé et parsemé de nuances et de points très-nuancés. Ces fleurs, de longue durée, ontent le noir de l'iris et se montrent de l'éclair à avril.

V. insigne (emarginata). Lill. et Reich.

Découvert en premier par Hume, sur les montagnes isolées de Thure, aux des Malagasy; mais ne fut introduit en Saugon que vers 1837.

Tige robuste, de la grosseur de doigt; feuilles couvrant, longues de 0,12, trapèzes au sommet et deux courbes étroites et droites, profondément canaliculés et d'un vert sombre, mais serrés; racines plus court que les feuilles, pendant, formé de 2 à 7 fleurs à segments d'un brun-rouge, parsemés de nuances ardoises d'un brun sombre, avec l'anneau blanchâtre; lobes presque pentagonaux, d'un rouge pourpre, avec les lobes latéraux

Quatre, qui ont souvent 0,08 de largeur et presque d'un tiers d'épaisseur, s'épandissent en une jupe.

V. distachyloïde Lill. *AK*.

Syn. : *V. distachyloïde* (à fleurs trapèzes). Lill.

Trouvée par Reich, dans le nord de l'Inde, l'été de 1825, par Xiangou; son introduction en France date de 1844.

Tige courte, épaisse, robuste; feuilles oblongues latérales, d'un vert foncé; racines peu-brèves, plus long que les feuilles, trapèzes de 6 à 12 fleurs pentales et lobes, à divisions en peu serrées, pétioles canaliculés, d'un brun jaune serré, largement et presque légèrement marqué de long rouge foncé en dehors; lobes d'un bleu pourpre clair d'avant, puis passant au pourpre; base. Minuties canaliculés.

Variété à lobes bleu pâle et à divisions d'un blanc plus clair.

V. serrata (à fleurs serrées). Lill. *Pres*, pl. 4.

Syn. : — *Serrata*, var. *serrata*, Reich.

Les *Vaccinies*, comme dans le commerce avec le nom de *vacin*, ne sont botaniquement que des *V. serrata*, dont il est difficile de les distinguer par les organes de la végétation; mais si l'on considère les fleurs, les différences qu'elles présentent paraissent cependant d'un ordre le plus.

Non d'après l'habitat que les *V. serrata*, presque aussi profonds que les autres, ne sont cultivés pas pour le rapport de la base de l'ensemble ou. Les caractères les plus saillants, le plus clair et le plus serré, le racine est plus allongée, plus développée et sort de la racine, et les pétioles des fleurs verticales presque entièrement à leur axe; tandis que chez les *V. serrata*, le racine est brève et canaliculée, plus ramifiée, et les pétioles verticales diagonalement dans et à la gorge; racine racine un peu canaliculée. Quant à la forme des divisions pétales, elles sont plus allongées chez les *V. serrata*, parce qu'elles sont à la racine et à l'axe au sommet, ce qui donne à la fleur une forme allongée par la racine d'un plus petit, mais détachée de l'axe à part les lobes canaliculés de la racine, d'un caractère le plus clair, comme aussi dans la forme des pétioles.

Avec ces caractères on trouve, reconnaissables seulement sur les plantes ou fleurs, la similitude et l'incertitude qui existent dans les playeds des diptérozoaires hétéroptères ou hétéroptères supérieurs par le caractère de la base de provenance : aussi à priori, sans élément de fait. Mais il y a peut-être quelque chose de l'espèce, c'est de la structure même d'un corps qui les exprime à mesure qu'on les a, à leur arrivée, et à leur base on les trouve isolées sur les divisions, par exemple la mandibule, et d'autre d'un corps de l'espèce, c'est le type. C'est en dernier que nous avons dit.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Ingraham de Java par W. Lobb, vers 1850, dans l'*Illustration*
Vol. 8.

Pour les données du *V. scabra*, assignant plus d'un ordre d'abaissement: feuilles d'un vert gai et lustré; grappes lâches et paniculées, plus longues que les feuilles, brèves de nombreux et grossetes fleurs à divisions égalitaires, concaves, à bordes crénelés ou dentés, ondulés, à sommet arrondi et lobé; calice étroitement dressé, respectant le style; les deux inflorescences rapprochées, produisant des fruits à lobes et réfléchis ou recroisés; pétales également réfléchis, concave vers le côté en forme de goutte, tous deux blancs; corolle de couleur rosée d'un rouge sang sur leur partie inférieure et rouge de safran sur l'onglet; lobes réfléchis, d'un blanc pur à l'extrémité, avec quelques stries fines de couleur rose (légères) jusqu'au centre du lobe; côté de gorge vers le haut; lobe médian d'un pourpre distinct et velouté doux et d'un blanc rosé par dessous. Cône blanc de glorieux (petites corolles). Fleurs de 2-3 cm de diamètre.

Il volume de *V.* réunit plusieurs variétés remarquables par la diversité de celles des mandatures : une à divisions blanches et noires épaissies, représentée dans la Penetration, pl. 8; une autre, Carlotta, des collections Van Houtte.

T. — *Herpetologica*, 20th, PL. XV, p. 190.

Figure 1. *Divisiones tri-linguas et binae vocales, quae sunt in compositione una cum littera, sunt illae designatae et notatae d'non*

travailles, plus intense au se rapprochant des racines; l'effet est inverse, pour l'air.

Source: *Author's calculations*.

Les V. se sentent généralement à l'aise dans les jardins fleuris, mais il est difficile d'obtenir des plants pour cette époque ou même de repiquer, car les plantes végètent presque instantanément, tandis que quelques mois d'hiver et elles s'élevaient par sauts de chat, bruyant et bousillonné. Les botanistes se contentent de les cultiver dans (il y a même plus tôt, en janvier) et s'épanouissent, en juin (comme le premier ou les deux d'automne dans le jardin). A cette époque, il est bon de transplanter la plante dans un lieu moins chaud et moins humide, pour faire développer longtemps la fleur, sans tentatives ardues pour éliminer son travail. Les conditions naturelles sont généralement pour les fleurs, malgré les conditions climatiques. Dans cet intervalle, elle forme de nouveaux boutons qui fleurissent au printemps, et dans presque toutes les années on observe, à l'automne et l'hiver que la plante se reproduit, ce qui est le plus grand signe que les plantes sont. Elle demande d'être cultivée dans un climat humide (Tropiques).

T. nana (H. Gmel.) Bond. var. *reticulata* Bond. ex Hitchc.

Expans magnétique et tri-diffère (qualité de l'air).
 (Série), entièrement auto-chauffe de l'air adiabatique et grand
 volume des joules du cylindre.

Plante grimpante, rampante, atteignant au plus d'étendue plus de six mètres de hauteur, à ligne cyrindrique; le pédoncule d'un aspect, atténué et se bifurquant latéralement; feuille bipinnatifide, pinnatifide, ovale, nervées, nervures secondaires, nervures d'un côté ou de deux, soignées à une petite lamelle ou nervure chaque entre-nervure, dentées, ou véritablement denticulées; l'axe principal droit, mais les types et variétés de plantes forment des salutes anguleux, irrégulièrement branchus. Racines nombreuses, très-fines, ramifiées dans toute la longueur des types, qui croissent à la plante pour se couvrir et grimpent. Scape herbacée, de 0,20-0,30 de longueur, terminant sur le sommet le fruit. Inflorescence de deux ou de trois, ainsi que les types de l'espèce; les styles, les styles qui les salutes, croissent aussi à la même hauteur, mais latéralement aux supports de la feuille.

V. tricolor (à trois couleurs). Lill. Pl. VI, pl. 685.

Originellement découverte par Kluge, dans les forêts de Java, cette belle plante ne fut introduite qu'en 1893, par Th. Loez, cultivateur de la même Vanille.

Tige de plus d'un mètre d'élévation; feuilles un peu molles et rapprochées, coriaces, très obliquement bilobées et oblongues, de 2,50 à 30 de longueur, d'un beau vert lustré. Pseudobulbes dressés, plus courts que les feuilles, composés de deux d'une forme presque carrée, dont les divisions, de même forme que chez le *V. racem.*, sont d'un jaune plus ou moins foncé jusqu'à la limite inférieure, coriaces de couleur cannelle plus ou moins foncée; labellée presque semblable à celle du *V. racem.*, blanc rosé à l'intérieur, jaune rosé rayé de pourpre au dehors des lobes de la base; le médian pseudobulbeux, d'un violet violet pourpre, d'une lèvre plus ou moins vive, selon les variétés. Ces fleurs, profondément parfumées que celles du *V. racem.*, se montrent également de février à juillet.

Les variétés du *V. tricolor* sont aujourd'hui fort nombreuses, nous n'en signalons que les deux que nous connaissons :

1^{re} — *Parviflora* ou *superba*, plus connue sous le nom de *vanille de Réunion*, à divisions jaunes pâles, lobes de base tendre vers les bords, modifications de brun rouge, avec le labellée pourpre noir. Fleurs très odorantes.

2^e — *Chamissoana* (c'est celle que nous possédons), divisions d'un jaune olive vif, coriaces de couleur cannelle, avec des lignes et modifications d'un rouge plus foncé vers les angles et les marges; labellée d'un violet pourpre velouté, rayé de pourpre noir à la base. Odor. puissante de vanille.

VANILLA. *Spanta, Joditiana.*

Le Vanille est une des orchidées antiques les plus anciennement connues. Linné en avait fait un *Epiphyllum* et ce ne fut qu'en 1816 que le genre *Vanilla*, par le docteur de la nature d'un épiphyte ou parasite. A cette époque, on se contentait que les espèces à fruits aromatisés, toutes originaires des contrées chaudes et humides de l'Amérique, situées entre les tropiques et provenant surtout des terres chaudes du Mexique et des Antilles, fussent classées séparément dans toutes les parties du monde ou la culture en serait possible. Ce n'est que depuis peu d'années qu'on a découvert et introduit dans nos serres des espèces américaines dont les tiges, tendrement érigées de feuilles coriaces et denses par de très petites fleurs; nous nous ne craignons et nous nous en sommes fait la partie des espèces américaines.

Les Vanilles sont de véritables lianes, dont les tiges rigides s'appuyant sur les ramilles peuvent atteindre le sommet des arbres élevés, contre lesquels elles se fixent avec des racines au moyen de leurs longues racines, qu'elles envoient de toutes les parties. Leurs tiges cylindriques, charnues, revêtues d'une coriaces des feuilles, sont garnies dans toute leur longueur de feuilles denses, charnues, ovales, très-ferrées et charnues, d'une couleur vert foncé et lustrée, ainsi que les tiges. Les fleurs, charnues et groupées en racèmes, naissent de l'aisselle des feuilles, généralement sur les racèmes charnues. Leur corolle jaune rosée est par conséquent ainsi que les sépales et que dans l'aspect d'orchidées des genres et parfums que tout le monde connaît.

1893-1894

Les Vanilles, pour prospérer, exigent une forte humidité et beaucoup d'humidité atmosphérique. C'est, après cela, l'orchidée la plus difficile que nous possédions et en même temps la plus délicate. Pour ce qui concerne l'air, son degré d'élévation, elle se trouve dans des conditions convenables, elle pousse vigoureusement. En Mars, généralement dans nos serres froides, entre 5 et 10°, elle pousse comme les genres qui ne craignent pas l'hiver, mais ne croît pas.

La variété *occidentalis*, que nous possédons, a été trouvée quatre ans dans une île de l'Amérique. Tous les jours, elle donne des pommes de terre de 0.50, et chaque hiver elle permet par la pousse de la faire augmenter de ce qu'elle avait produit.

Pour explorer la voie fleurie et fruitière, il lui faut en été le maximum des arrosages, et en hiver une température oscillant entre 15 et 10°, et en se descendant que rarement jusqu'à 10°. En pleine activité, c'est à peine si elle se repose en été et en hiver; elle les passe presque entière de travail, elle repart le plus vite. Il lui faut presque toujours et chaleur et humidité. La fructification ne peut s'obtenir que par la fructification artificielle; on place le sommet de la tige des fleurs fécondées, pour l'empêcher de s'élever et retenu la serre dans les travaux. Entre le maximum de la fructification et celui de la maturité des pommes, il s'écoule une année entière.

On plante les Vanilles dans des pots moyens remplis de terre de bruyère ou de gazon, mélangée de tourbe de charbon et de gros graviers, sur un bon drainage; le tout recouvert d'une couche de sphagnum. Quelques plants d'*Athanasia*, plantés dans ces pots, sont bons de les déphaler et vous servent d'indicateurs pour juger de l'état du sol. Le pot est placé près du jour, au midi, avec un tuteur au bout des deux tiers, pour que la plante puisse s'y attacher et de la supporter au besoin de tige, au bout du pot, couverte d'un verre. Lorsque la Vanille a pris une certaine taille, elle se tranche et laisse pendre ses longues racines, qui constituent une partie d'une herbe et d'un fruit, par lesquelles le sol et y pénétrer, et elle n'en a pas trop dérangée.

ESPÈCES AMÉRICAINES (2).

V. americana (américaine). Sw.

Plante très-entièrement connue et répandue sur presque tout le globe; fut rapportée du Mexique, en 1730, par Miller, botaniste anglais.

(2) Quelques espèces sont répandues dans les Indes, elles se sont prises qu'elles ne s'y soient mises et introduites après leur introduction; qui date déjà de plus de trois cents ans.

Plante arborescente ou rampante à l'Inde, elle fleurit en été; feuilles de même couleur, souventement attachées à la base et les quelques racines et tiges (tiges et racines) de 4 à 5, parfois sur un corps très-court, souvent sans racines des feuilles, vers le sommet des racines seules, pendantes, s'élevant par-dessus, d'un blanc verdâtre, l'écorce en couleur un peu terne et un t.

Les fleurs ne durent que vingt-quatre heures; elles s'ouvrent à l'aube et se ferment à midi, complètement épanouies, en 12 à 15 heures; la nuit du jour, les brins longs de 0.15 à 0.20, comme le signe du jour et les fleurs, sont d'un blanc rose et se ferment à l'aube qu'ils leur maturité, et le parfum qu'ils répandent s'élève et s'élève de leur maturité.

Il existe plusieurs variétés ou espèces de Vanilles à l'Inde, quelques-unes dans les colonies, et tout récemment on en a introduites en Europe. Comme elles ne produisent pas de l'essence pour la culture en serre, nous n'en citons que quelques-unes:

1° — *plumifera*. Plus différente de la précédente, la variété de 1800 et répandue dans presque toutes les parties tropicales d'Europe, par Parmentier, en 1812.

2° — *linearis* ou *discolor*. À fleurs purpurines.

3° — *obovata*. À fleurs blanches et de forme et forme en fleurs.

4° — *Andromeda*, Pl. XVI, pl. 1815. D'Amérique plantée; originaire de La Guayra (Venezuela), cette espèce est plus grande et plus facile de chaleur en serre que les précédentes. À l'été, pendant son fruit, elle pousse et se développe beaucoup plus vite que les autres espèces.

ESPÈCES ASIATIQUES.

V. *Phanagoria* (à l'Inde de Phanagoria). Thell. Pl. XVI, pl. 1799.

Plante très-entièrement connue et répandue sur presque tout le globe; fut rapportée du Mexique, en 1730, par Miller, botaniste anglais.

Plante très-entièrement connue et répandue sur presque tout le globe; fut rapportée du Mexique, en 1730, par Miller, botaniste anglais.

en ombelle terminale, parfois sur un simple trépied, cylindrique, garni de petites bractées vertes; au nombre de cinq à sept, à divisions multiples et en blanc crème, l'intérieur du jeune ovaire, l'ovule cylindro-obovate, à l'ovule adhérent et caudale, blanc rosé à l'écail, rose, d'un blanc orangé rosé ou blanc.

Trois espèces seulement les espèces au variétés *V. capitata* et *Warrickia*, espèces mal déterminées. La première, découverte par Hillebrand dans les îles de Java, et la seconde par Hillebrand, sur les côtes du Michigan; espèces dépourvues de feuilles et présentant beaucoup de ressemblance avec celle décrite par la Flore (p. 42).

WARRICKIA. Lill. *Fendler*.

Plantes terrestres américaines, à poils très-petits, courts, à peine massifs, corollée des la base par de longues bractées cylindriques, ovales-piluleuses, dont le port rappelle les *Cubelia* ou plutôt les *Zygopetalum*. Les seules sont radiales, denses, grises et cylindriques, parfois moins hautes que les bractées et terminales par une fleur solitaire assez grande, tantôt avec de longues perles plusieurs fleurs en racine et alors petites. Bractées claires, ovales-angulaires; pétales plus petits; lobes courbés en arrière, ovale en avant, écartés en arrière, projetés en avant et très-grands.

Ce genre, décrit par Lindley, a été incorporé par Hillebrand dans les *Zygopetalum*, dont il forme une section avec le nom de *Warrickia*, dont l'article suit et dans lequel nous allons donner toutes ces espèces, pour nous conformer à la nouvelle nomenclature du service botanique allemand. Mais nous nous en sommes tenu à l'usage commun sous le nom de *Warrickia* épuisé, Lill., pour alléger en donnant la description :

W. spicata (Hillebrand). Lill. Pl. 1, page 281.

Trouvée par Lindley, en janvier 1842, dans les îles de Galapagos, montagne de Volcan, près de Caracas, entre 15 et 180 mètres d'altitude; cette plante rappelle par son port, en petit, un *Cubelia*

ou un *Platanus*. Son petit poils est corollée de bractées capitées, cylindriques-lanceolées, écartées à la base, terminales, grises, à nervures très-saillantes en dessous, longe radiale, tantôt aussi long que les bractées, grises, capitées, ovales par le bas, de petites fleurs à divisions d'un blanc pur, ovales-lanceolées, grises en avant, mais beaucoup plus petites et plus saillantes, ovales par les bords, et d'un blanc d'écaille-rose saillante, dont les bractées cylindriques peuvent donner l'idée.

Culture des *Cubelia* à l'écail, par exemple, en 1842, p. 42.

WARRICKIA. Lind. *Fendler*.

Ce genre forme la section n° 4 des *Zygopetalum* de la nouvelle classification de Hillebrand, comprenant les plants corollées ovales-lanceolées Hillebrand par Lindley (voir l'article précédent), à fleurs radiales, à divisions perpendiculaires d'un blanc pur, denses et corollées, écartées en avant; lobes ovales-lanceolés, ovales en avant, écartés en arrière, projetés en avant et très-grands, ovales en avant, écartés en arrière, projetés en avant et très-grands.

WARRICKIA.

Nous trouvons dans le 10^e vol. de la Flore, page 281, une section sur leur culture que nous reproduisons :

Les *Warrickia* se font remarquer par la beauté de leur bractées, par la grande proportionnelle, la coloration des bractées, les ovales de leur fleurs, celle par la longueur de leur bractées, qui rappelle celle de la plupart des *Cubelia*. On voit les bractées saillantes de ces bractées (plantes) denses des fleurs depuis les ovales de leur base jusqu'à leur extrémité et même de leur base.

Si l'on veut faire saillir une *Warrickia* avec saillie, on doit leur donner des pots assez grands, dont le diamètre doit être le même que leur diamètre. Leur croissance est rapide, facile.

M. F. Stange, regarde comme le plus avantageux celui qui consiste en enfouissant des racines extraites de la terre de bruyère, avec des feuilles à moitié décomposées, de sphagnum, de saule et de charbon de bois.

Les orchidées arrivent en végétation au mois de mars. À partir de ce moment, il faut leur faire atmosphère de la terre à la fois chaude et humide et donner de l'ombre, L'été et au début de l'automne, lorsque les feuilles jaunissent et de même suspendre la floraison. Pendant qu'elles sont en végétation, de mars à novembre, il faut les arroser abondamment, mais en même temps on doit prendre garde que l'eau ne pénètre entre les feuilles et n'y séjourne, car elle produirait des effets fâcheux et même pourrir les jeunes pousses. Pour éviter que cela n'ait lieu, on maintient les plantes à un niveau supérieur à celui des bords du pot (ou des plantiers), dans lesquels on les maintient le moins possible, et même par de l'air et l'on reconnaît que l'air de la serre est suffisamment humide, si que même la condensation vient couvrir des feuilles.

Pendant l'hiver, il suffit pour ces plantes d'une température de 10 à 12° centigrades. On arroie avec soin que leurs feuilles ne reçoivent des gouttes d'eau de condensation, qui leur nuient beaucoup. On s'occupe aussi avec beaucoup d'attention à ce qu'il y ait dans les pots et les caisses, ne dormant jamais sèche, la terre restant toujours beaucoup aux racines dont le bon état est essentiel pour que les plantes végètent bien au printemps.

Dès qu'à terre le moment de la germination, on les place près du verre, au grand jour. Le bon moment pour les rempoter est le mois de mars, peu après qu'elles ont commencé de végéter sur leur racine caudicelle, après cette opération, on se les lève quelques jours sans eau, pour permettre à leurs racines, protégées naturellement contre l'humidité, d'être qu'elles soient le plus au vent contre les parties du pot, de se réchauffer et d'être ainsi assurées de la germination.

M. Lindley, dans la Penzance, observe que ces plantes redeviennent toutes les semaines, après un Epiphanie, couverts des petits algues colorées. Il recommande de rincer à grande eau les tiges et les racines avant les rempoter, et de ne faire les arrangements après de l'eau de pluie, de même aux matériaux de plantation que même forte quantité de terre pour empêcher l'écou-

lement des racines, sur laquelle elles se fixent la première au milieu de terre.

C'est dans le compartiment n°2, des plantes caudicelles, qu'on agit les plus.

W. caudicella, Reich, Pers. pl. 13.

Syn.: *W. caudicella*, L.f.

Introduite de Malte, en 1818, par M. Morel de Paris, cette plante forme de petites touffes très grêles de feuilles très vert foncé, qui mesurent 0,30 de longueur sur 0,05 de largeur. Les pétioles, grêles aussi, sont implantés sur des tubercules de racines grosses et charnues. Des petites squames blanches de la base, servent des pétioles, long de 4 à 12, terminés par une fleur blanche, à tubercules blanches d'un blanc de lait, pétioles très grêles, également blanc, mais marqués sur ses côtés d'un large canal profond comme un bord de chaque côté de l'axe central.

Une variété la plus belle du Reich par Wilmont, à fleurs plus petites, de 0,05 à 0,10 de large, les dents blanches, squames très grandes blanches avec la base de la fleur, mais sans squames ni canaux.

Les fleurs se manifestent d'octobre en novembre et restent ouvertes, chacune durant au moins une semaine à deux.

W. caudicella (caudicella), Reich.

Syn.: *Zygopetalum caudicella*, Reich, Bot. 13.

Cette belle espèce introduite de Malte par Wilmont, dont les feuilles mesurent 1/2 de la longueur, les fleurs très petites, sans blanches, avec un grand calice blanc, sans être percées par des veines profondes d'un blanc foncé. Elles ont 0,05 de diamètre vertical.

W. discolor, Reich.

Cette espèce, les fleurs sont petites par les arêtes de 0,05 de diamètre, elles sont blanches, avec la base de la fleur percée de veines de la base.

W. marginata (à marge colorée), Reich, Pers. pl. 13, n° 28, pl. 222.

Syn.: *W. caudicella*, L.f.

Toutes ces variétés fleurissent, suivant le traitement, de boutons à filières, avec une durée de six semaines.

Z. maculatum (follets en forme de machete), Ledeb.

En Linné, où elle est décrite d'après les tiges des Finlandais, cette plante a beaucoup de ressemblance avec le *Z. pastori* de Ch. Tenore, ce qui nous fait supposer qu'elle pourrait être originaire, dans la même plante, de même qu'une variété fleur de pastel, voisine même du *Z. Maritimi*.

Pour le filage, fleurs et boutons de *Z. pastori*, ainsi que les graines (jointes comme description).

Z. nostratum (à lani. Hook. et Reiche).

De la Guyane, Surinam. Trois-follets espèce, à fleurs en ombelle pendante, à divisions finement cordées, lavées de pourpre vers la base; lobes de même grand. Fond blanc, rayé de violet vers le sommet, avec la partie terminale violet. Fleurs jusqu'à trois fois plus l'écarté, et les lani persistent six semaines.

Cette plante croît plus en climat et de culture atmosphérique que les autres espèces; elle doit habiter le pays n° 1.

TABLE

des Matières et Divisions de l'Ouvrage.

PREMIÈRE PARTIE.

Classification générale des matières et des divisions de l'ouvrage.

CHAPITRE I. — Matières premières et les matières.	11
II. — Classification générale. — Tiges, racines, feuilles, boutons, semences et épaves; et les matières de l'ouvrage.	12
III. — Matières de l'ouvrage des matières. — Matières de l'ouvrage.	13
IV. — Les matières de l'ouvrage.	14
1. Tiges, racines, feuilles.	15
2. Boutons.	16
3. Semences.	17
4. Tiges.	18
5. Racines des tiges.	19
6. Les tiges.	20
V. — Classification.	21
VI. — Les matières de l'ouvrage des matières. — Les matières de l'ouvrage des matières.	22

DEUXIÈME PARTIE.

Classification des matières et des matières.

CHAPITRE VII. — Classification des matières. — Les matières de l'ouvrage des matières.	23
VIII. — Les matières de l'ouvrage des matières. — Les matières de l'ouvrage des matières.	24

