

La idea

El manual del que extraemos el presente reportaje se edita a partir de la idea de dar a conocer a los jugadores los animales más comunes que pueden observar mientras juegan al golf, así como para despertar el interés por la naturaleza en jugadores y visitantes de las instalaciones del club. En el manual al que nos referimos y que a continuación citamos se describen aves, mamíferos, reptiles y anfibios, su hábitat, y los momentos y lugares del campo donde pueden ser observados. Para conocer con más amplitud la fauna del Club de Golf Costa Dorada, existe bibliografía especializada en las especies tratadas.

Otras especies


Aves: aparte de las especies citadas, podemos observar en invierno, en los lagos, a la garza real, la garceta común y el zampullín chico, en el campo, el zorzal charlo y el zorzal común. En verano a la golondrina común, al abejarruco común y al chatocabras pardo. En el campo, y durante todo el año, podremos observar a jilgueros, verderones, verdicillos, pinzones, herrerillos, currucacapitoradas, mirlos, colirrojos, bisbitas, y escuchar a los mochuelos en algún rincón del campo. En los lagos y correteando por los alrededores, encontraremos a las pollos de agua.

Mamíferos: ratón de campo y Jabalí.

Reptiles y anfibios: además de galápagos, sapos y lagartos, podemos encontrar en los lagos ranas croando y alimentándose de mosquitos.

En las paredes secas y los jardines del club observamos a la salamancha común y a la lagartija tomando el sol o cazando algún insecto.

Todos estos animales, aunque para algunos no muy bellos, son muy beneficiosos para nosotros ya que se alimentan de muchos insectos perjudiciales para el ser humano.



AVES

Paloma torcaz



Ave sedentaria, más grande que una paloma Bravía, de color gris azulado con el pecho parduzco y marcas blancas en cuello y alas. Nidifica en zonas arboladas y en árboles solitarios. Es una ave forestal. Se encuentra en todo tipo de bosques.

Tórtola Turca



Ave sedentaria, procedente de Asia. Llegó a Cataluña en los 70. De pequeño tamaño, esbelta y con cola larga, de color de ante pálido con una banda negra en el cuello, y la punta de las alas de color negro. Se alimenta de semillas que recoge del suelo, aparte de esta tórtola también podemos encontrar la tórtola común, se trata de un ave estival, pequeña y ligera. Por encima es marrón rojizo, y oscura por debajo de las alas. Tiene la cola corta, con la punta de color blanco, y en el cuello una mancha blanca rallada de negro. Vive junto al hombre, se instala en parques, jardines y urbanizaciones.

Abubilla

Ave migratoria, pero debido al buen clima de esta zona, se ha vuelto sedentaria. Tiene el dorso pardo rosáceo, un rallado blanco y negro en las alas y en la cola, el pico largo y curvado y sobre la

cabeza una cresta muy característica. Se alimenta de insectos y larvas que extrae de su

escondite con su largo pico. También las puede extraer de tierras blandas como el césped. Común en terrenos cultivados con bosques abiertos, parques y jardines.

Pito real



Ave sedentaria, con el dorso de color verde, el vientre claro, las plumas de encima de la cola amarillas, las alas con manchas blancas y roja la parte alta de la cabeza. Se alimenta de insectos y larvas que saca de los árboles o encuentra en el suelo. Se le encuentra desde la alta montaña hasta los cultivos de secano.

Lavandera blanca



Ave sedentaria, inconfundible por su color gris y negro del manto, blanco por debajo, y sobretudo por los movimientos que hace con su larga cola cuando camina. En verano, el macho tiene la garganta negra, mientras la hembra, tiene, en el mismo sitio, sólo una franja también negra. Es muy común verla en invierno, debido a los ejemplares que llegan del norte y centro de Europa, buscando climas más suaves. Se alimenta de pequeños insectos y arácnidos, que captura mientras camina por el suelo. Se encuentra en terrenos abiertos y con vegetación baja, como por ejemplo el campo de golf.

Petirrojo



Ave sedentaria, de pequeño tamaño, característica por la mancha de color naranja del pecho y el gris marrón del dorso y la barriga blanquecina. Tiene el pico fino y puntiagudo, y los ojos completamente negros. En invierno es muy común, debido a los ejemplares que llegan del norte y centro de Europa, buscando climas suaves. Se alimentan de insectos terrestres y de diversas bayas y frutos. Se les encuentra en zonas forestales ocupando las partes bajas, necesita zonas claras para buscar su alimento, por lo que un campo de golf se convierte en un buen lugar.

Mosquitero común



Ave sedentaria, de pequeño tamaño, de color amarillo verdoso pálido, más claro por debajo. Pico largo y puntiagudo, con una franja clara a través del ojo, y cabeza poco destacada. Se alimenta de pequeños insectos que atrapa en el suelo o por el aire. En otoño llegan grandes cantidades del centro y norte de Europa, ya que consideran nuestras tierras su cuartel de invierno. A finales de marzo, principios de abril vuelven a sus tierras de origen. Se les puede encontrar en zonas húmedas y torrentes.

Urraca

Ave sedentaria, de color negro brillante que se tornasola de verde y azul metálicos en su larguísima cola, y de un color blanco purísimo en el abdomen y en la zona alar media. Cria en árboles o en arbustos grandes. Es omnívora, se alimenta en campo abierto con vegetación baja.



Anade real

El macho, durante la reproducción, presenta un plumaje muy espectacular, pico amarillo, cuello y cabeza verde, garganta marrón rojiza y espalda gris. Cuando termina la reproducción el macho cambia la pluma y le aparece una coloración marrón con manchas negras, más mimética, como la hembra, pero con el pico amarillo y no anaranjado como el de ella. Se alimenta de semillas, frutos secos, plantas, insectos y otros pequeños animales acuáticos. Se le puede encontrar en todo tipo de aguas dulces.

Muy abundante en todos los lagos de los campos.

Ratonero común

Ave rapaz de tamaño medio, básicamente de color marrón oscuro. En vuelo tiene las alas anchas y redondeadas con manchas pálidas, cola grande y redondeada, con una franja oscura. Las patas, desnudas de pluma, son de color amarillo. Es una de las rapaces más abundantes de Europa, a menudo se posa en los postes de teléfono, al descubierto, o en los árboles. Se alimenta de roedores, pájaros jóvenes, reptiles, anfibios e insectos. Habita en pequeños bosques que limitan con terrenos cultivados o cualquier terreno apto para la caza.



Cernicalo común

Pequeño alcón de color teja con la cola larga. El macho, a diferencia de la hembra, tiene la cabeza gris y la cola del mismo color, con una franja negra al final. Se alimenta de pequeños roedores, aves terrestres, ranas, lagartijas e insectos. Es común en zonas cultivadas con campos y prados yermos, hasta la alta montaña pirenaica.



Perdiz común

Ave sedentaria con el dorso de color marrón-gris, los flancos barrados, el collar oscuro, la garganta blanca, el pico, las patas y el contorno de los ojos de color rojo. Se alimenta de semillas, plantas e insectos. Es común en terrenos abiertos, pastos, cultivos, como campos de cereal, y en vertientes de montaña baja.



Chocha perdiz

Ave migratoria, rechocha, con el pico largo y los ojos situados en la parte alta de la cabeza. Su plumaje es de un marrón rojizo muy atractivo. Procede del



centro y norte de Europa, empieza a llegar a finales de octubre, y se marcha a finales de febrero. Se alimenta de gusanos e insectos que captura perforando el suelo con su largo y sensible pico. Se la encuentra en bosques húmedos de planifolios, como robadales o hayedos, siempre relacionada con ambientes húmedos, como los campos de golf.

Estomino pinto

Ave sedentaria, gregaria, de plumaje negro manchado de blanco, con iridiscencias verdosas y rojizas. Vuela en grupo, que puede llegar al millar de indi-



viduos en invierno, debido a los ejemplares que llegan del norte de Europa buscando un clima benigno. Se alimenta de gusanos entre el césped; clava el pico, lo abre, mira el agujero, y si ve alguno se lo come. Los agujeros son claramente visibles en el terreno. También come bayas, frutos y semillas. Ocupa áreas abiertas poco arboladas y zonas de cultivo.



MAMÍFEROS

Ardilla

Roedor mediano, con la cola larga cubierta de pelo. La coloración es variable; en verano el dorso y la cola son rojizos y en invierno el dorso es más grisáceo. El vientre es siempre blanco. En el campo de golf se alimenta principalmente de semillas de pino. También puede comer semillas de haya, roble, avellano, castaño, así

como insectos, caracoles y huevos. Se la puede encontrar en todo tipo de bosques.

Topillo

Pequeño roedor de cuerpo alargado y cola corta, que presenta adaptaciones a la vida subterránea, como por ejemplo, ojos y orejas pequeñas y craneo aplanado. De hábitos cavadores, con pelaje corto y denso. Cuando son jóvenes presentan una coloración gris oscuro, y con el tiempo se vuelven de color marrón terroso. Se alimenta de raíces, bulbos, tubérculos y otras partes del vegetal. Coloniza espacios abiertos, cultivados o abandonados, que contengan herbáceas, como puede ser una amplia zona de césped.



Conejo

Roedor medio, con orejas largas, de color gris con tonalidades pardas, el vientre claro, la cola corta de color negro o gris por encima y blanco por debajo. Cuando corre se ve la parte blanca de la cola como un semáforo. Se alimenta de vegetación herbácea. Se le encuentra en campo abierto, con refugio de matorral y terrenos arenosos y arcillosos donde excavan sus madrigueras.

REPTILES Y ANFIBIOS

Sapo común

Sapo muy grande, que puede llegar a los 150mm. de longitud, con los ojos de color dorado o cobre y piel muy berrugosa. Su coloración dorsal es parda, generalmente uniforme, pero a veces con zona más oscuras. La parte inferior es blanque-



cina o gris. Animal de costumbres crepusculares o nocturnas, que de día se esconde debajo de piedras y troncos. Se alimenta de insectos, arañas y gusanos. Aparece en diferentes ambientes como bosques, prados o zonas cultivadas, desde el nivel del mar hasta la media montaña.

Lagarto ocelado

Es el lagarto más grande de la Península. La cabeza y el cuerpo pueden superar los 20cm. de longitud, y la cola de 1'5 a 2 veces más larga que éste. En total llega con frecuencia a los 60cm. Su cabeza es maciza y ancha, el tronco es relativamente aplanado y la cola es fuerte y ancha. El dorso, verde o gris pardo, el vientre y la garganta amarillo verdoso y los flancos presentan unas manchas azules muy patentes. Se alimenta de saltamontes, escarabajos, caracoles, arañas y ocasionalmente lagartijas y roedores. Se le puede encontrar en muy diversos ambientes, pero prefiere zonas secas con cobertura vegetal poco densa, bosques más o menos abiertos, cultivados y márgenes de carretera.



Galápago leproso



Tortuga con un caparazón que puede llegar a los 20cm. de longitud, de color castaño, gris o verdoso, con carena vertebral. Presenta unas **raillas** de color claro muy características en el cuello y las placas inguinales. Su alimentación es carnívora, come principalmente larvas y adultos de rana, peces, crustáceos y moluscos.

Acostumbra a ocupar aguas dulces relativamente extensas y abiertas.

En las rieras mediterráneas queda acantonada en las pocas charcas que se mantienen en verano.

Puede soportar aguas contaminadas y un poco saladas.